

کد کنترل

901

A

صبح جمعه

۱۳۹۸/۱۰/۶

دفترچه شماره ۱ از ۱



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

... در کار کارگزارانت بنگر و آنان را با آزمودن به کار گمار و به  
میل خود و بی مشورت دیگران آنها را سرپرست کاری مکن ...  
از نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر

## آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸

### رشته آبزیان و شیلات (کد رشته ۰۱)

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۶۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مجموعه سؤالات رشته آبزیان و شیلات	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه سؤالات رشته آبزیان و شیلات	مواد امتحانی	۶۰	۱	۶۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۸

دی ماه

دانشگاه امیرکبیر



\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پایین پاسخنامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

- ۱- کدام مورد، ترتیب صحیح مراحل زندگی میگو را نشان می دهد؟
- (۱) تخم - ناپلیوس - پرتوزا - مایزیس - پست لارو - میگو
  - (۲) تخم - ناپلیوس - زوا - مایزیس - پست لارو - میگو
  - (۳) تخم - مایزیس - زوا - پست لارو - میگو
  - (۴) تخم - مایزیس - پست لارو - زوا - میگو
- ۲- کدام مورد، از کاربردهای معمول آهک پاشی در مزارع پرورش ماهی نیست؟
- (۱) رشد پلانکتون های گیاهی
  - (۲) جلوگیری از نوسانات pH
  - (۳) کاستن از اثرات کوددهی مزارع
  - (۴) نابودی تخم لارو حشرات آبزی موجود در لجن کف استخر
- ۳- کدام مورد درخصوص **Landing Net**، صحیح است؟
- (۱) تور کوچک سبدمانندی که برای جمع کردن ماهیان از تور بزرگ به کار می رود.
  - (۲) موجود زنده ای که به عنوان طعمه برای صید ماهی به کار می رود.
  - (۳) منطقه اصلی صید ماهیان در نواحی سطحی آب است.
  - (۴) تورهایی که در خط ساحلی برای صید به کار می رود.
- ۴- به منظور استحصال غده هیپوفیز از ماهیان زنده جهت استفاده در تکثیر مصنوعی، اولین اقدام چیست؟
- (۱) ماهی در فرمالین فیکس می شود تا شرایط استحصال غده هیپوفیز فراهم شود.
  - (۲) کل مغز ماهی که در داخل فرورفتگی کف کاسه سر است، برداشته می شود.
  - (۳) مستقیماً هیپوفیز از مغز تخلیه و در استون نگهداری می شود.
  - (۴) برانش ماهیان بریده می شود تا خون ماهی خارج شود.
- ۵- کدام نوع حرکت در ماهی ها، حرکت پیچشی **Flashing** است؟
- (۱) ناگهانی که در زمان ریختن دستی غذا در مزارع پرورش ماهی دیده می شود.
  - (۲) ناگهانی و سریع که در زمان آفتاب سوختگی در مزارع ماهیان سردآبی بروز می کند.
  - (۳) ناگهانی و غیرعادی که معمولاً بر اثر بعضی از انواع انگل های خارجی به وجود می آید.
  - (۴) ناگهانی و غیرعادی که در زمان کمبود اکسیژن در مزارع پرورش ماهی دیده می شود.
- ۶- کدام **Fishing Mortality** چیست؟
- (۱) مرگ و میر موجودات آبزی بر اثر بروز کشنده قرمز
  - (۲) میزان درصد ماهیان غیر مأکول صید شده در هر بار صید دریایی
  - (۳) مرگ موجودات آبزی، از جمله ماهی ها، بر اثر فعالیت های صیادی
  - (۴) مرگ و میر دسته جمعی ماهیان در مزارع پرورش ماهی به دلیل بروز یک بیماری همه گیر تجزیه و تحلیل مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی، با کدام نام اختصاری شناخته می شود؟
- |           |         |
|-----------|---------|
| HACCP (۲) | NRC (۱) |
| HAACP (۴) | SPF (۳) |



## -۸ Cephalothorax چیست؟

- (۱) سوراخ‌های تناسلی میگو بوده و در قاعده سومین زوج پاهای حرکتی قرار دارد.  
 (۲) گیرندهای حرارتی شیمیایی که در سطح بدن میگو قرار داشته و نسبت به فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی حساس هستند.

- (۳) در انتهای قدامی بدن قرار گرفته که در لبهای بالایی و پایینی آن، دندانهای رو به جلو مشاهده می‌شود و به تلسون ختم می‌شود.

- (۴) قسمت سر سینه میگو که از اتصال سر و سینه ایجاد شده و کلیه زواید بدن میگو، با استثنای پاهای شنا از این قسمت منشأ می‌گیرد.

-۹ کدام مورد، جزو بیماری‌های ویروسی آزادماهیان نیست؟

- (۱) Vibrio  
 (۲) IPN  
 (۳) IHN  
 (۴) VHS

## -۱۰ کدامیک از ماهیان زیر، گوشت خوار هستند؟

- (۱) ساردينیا ماهیان (Clupeidae)  
 (۲) خاروماهیان (Soleidae)  
 (۳) راشگوماهیان (Serranidae)

## -۱۱ کدامیک از ماهیان زیر، زنده‌زا هستند؟

- (۱) آروانا  
 (۲) دم‌شمیری  
 (۳) سیلور دالر  
 (۴) اسکار

-۱۲ کدام مورد درخصوص به کارگیری غذای کنسانتره ماهیان خاویاری، صحیح نیست؟

- (۱) باید دارای ۳۵ تا ۵۰ درصد پروتئین خام باشد.  
 (۲) باید حاوی ۱۰ تا ۲۰ درصد چربی خام باشد.  
 (۳) رطوبت غذا بیش از ۱۰ درصد نباشد.  
 (۴) رنگ غذا باید روشن باشد.

## -۱۳ از کدام مورد، می‌توان برای تعیین سن ماهیان استفاده کرد؟

- (۱) پرلیت  
 (۲) اتولیز  
 (۳) اتوکلاو

## -۱۴ از نوک پوزه ماهی تا ابتدای حلقه چشمی، چه نام دارد؟

- (۱) طول دهان (F.L.)  
 (۲) طول سر (H.L.)  
 (۳) طول استاندارد (C.L.)  
 (۴) طول پوزه (S.L.)

- ۱۵ تعداد دفعات غذاده‌ی به فیل‌ماهی پرورشی ۱۰۰۰ گرمی در دمای مطلوب رشد، به ترتیب، در هر روز چند مرتبه و به میزان چند درصد از وزن بدن است؟

- (۱) ۲ و ۱۵  
 (۲) ۳ و ۲۰  
 (۳) ۵ و ۱۰  
 (۴) ۵ و ۲۰

## -۱۶ کدام مورد، تعریف مهاجرت کاتادرومی است؟

- (۱) مهاجرتی که ماهیان آب شیرین انجام می‌دهند و جهت تخریزی و تولید نسل به دریا می‌روند.  
 (۲) مهاجرت‌های پی‌درپی و فصلی بین آب شیرین رودخانه و مصب دریاچه‌ها و برعکس را می‌گویند.  
 (۳) مهاجرتی دسته‌جمعی با هدف دستیابی به محل انشاست مواد غذایی، جهت تغذیه و رشد بیشتر است.  
 (۴) مهاجرتی که ماهیان آب شور انجام می‌دهند و جهت تخریزی و تولید نسل وارد آب شیرین می‌شوند.

- ۱۷ طبق استاندارد شماره ۵۶۱۰ ویژگی‌ها و روش‌های آزمون غذای آبزیان پرورشی (ماهی و میگو) (سازمان ملی استاندارد ایران)، کدام مورد پذیرفتگی نیست؟

- (۱) وجود پراکسید بیش از ۵ میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم چربی استخراجی از خوراک ماهی و میگوی پرورشی مجاز است.

- (۲) میزان خاک خوراک ماهی و میگوی پرورشی، به شکل پلت، کمتر از ۲ درصد وزن خوراک باشد.

- (۳) استفاده از هرگونه هورمون، در تهیه خوراک ماهی و میگوی پرورشی مجاز نیست.

- (۴) خوراک ماهی و میگوی پرورشی، باید بدون اوره و ازت غیرپروتئینی باشد.



-۱۸

کدامیک از ماهیان زیر، تخم‌گذار هستند؟

- (۱) مولی  
 (۲) گوبی  
 (۳) آنجل (فرشتہ‌ماهی)  
 (۴) پلاتی

کدام مورد، تعریف تلاش صیادی (**Fishing Effort**) است؟

- (۱) نسبت مقدار صید ماهی به مقدار ماهی موجود در ناحیه صید را می‌گویند.  
 (۲) مجموعه‌فعالیت صیادی که در نواحی مشخص و زمان خاص انجام می‌پذیرد.  
 (۳) مجموعه‌روش‌های صید با کمک ادوات صید است.  
 (۴) مجموعه‌لایهای آب که برای صید ماهی در نظر گرفته می‌شود.

-۱۹

کدامیک از ماهیان زیر، در اعمق دریا زندگی می‌کنند و در هنگام شب، تا اعماق میانی آب بالا می‌آیند؟

- (۱) منقارماهیان (Belonidae)  
 (۲) ساردین‌ماهیان (Clupeidae)  
 (۳) تون‌ماهیان (Stromateidae)  
 (۴) فانوس‌ماهیان (Myctophidae)

-۲۰

کدام مورد، از دلایل کاهش FCR است؟

- (۱) غذادهی کمتر از حد لازم  
 (۲) غذادهی یکنواخت در تمام ساعات روز  
 (۳) بالانس مناسب انواع مواد غذایی موردنیاز ماهی  
 (۴) محاسبه غلط میزان غذای موردنیاز ماهی

-۲۱

کدام مورد در خصوص پرورش کپورماهیان، صحیح نیست؟

- (۱) بازاریابی کپورماهیان پس از صید آنها، اقدامی ضروری است.  
 (۲) بهترین روش صید و عرضه ماهی به بازار، به صورت مرحله‌بهمرحله است.  
 (۳) در زمان برداشت و صید ماهی، باید مقدار حجم آب استخراها کاهش یابد.  
 (۴) در طول دوره پرورش، با افزایش تراکم ماهی، واپستگی به تغذیه دستی افزایش می‌یابد.

-۲۲

در حمل و نقل بچه‌ماهیان قزل آلا با تانکر، استفاده از کدام مورد زیر توصیه نمی‌شود؟

- (۱) زئولیت  
 (۲) عصاره پودر گل میخک  
 (۳) نمک طعام بدون ید  
 (۴) فرمالین

-۲۳

کدام مورد، محل مناسبی برای استقرار سینی‌های غذادهی در مزارع پرورش می‌گو است؟

- (۱) مجاورت دستگاه‌های هواده  
 (۲) محل تلاقی شیب دیواره با کف استخر  
 (۳) کنار ورودی‌های استخر

-۲۴

اصلی‌ترین عامل در تعیین قیمت تمام‌شده ماهی، کدام مورد است؟

- (۱) ماهی مولد  
 (۲) غذا  
 (۳) هزینه کارگر  
 (۴) هزینه دارو و درمان

-۲۵

زوج (Zoug)، کدام است؟

- (۱) وان‌های کوچک نگهداری بچه‌ماهیان کپور است.  
 (۲) انکوباتورهای افقی حامل سینی هستند که در آن، تخم چشم‌زده رشد می‌کند.  
 (۳) انکوباتور مخصوص تخم‌پروری کپورماهیان به‌طوری که آب از قسمت تحتانی وارد و باعث حرکت ظریف تخم‌ها می‌شود.  
 (۴) انکوباتور مخصوص تخم‌پروری به‌طوری که آب از قسمت فوقانی به آن وارد شده، تخم‌ها به حرکت درآمده و با مکش ملایم، آب همراه ذرات معلق از قسمت تحتانی خارج می‌شود.

-۲۶

کدام مورد زیر، از مشکلات آبششی (**Gill Problems**) در بچه‌ماهیان تازه‌به‌تغذیه‌افتاده نیست؟

- (۱) تلفات پیوسته و زیاد  
 (۲) شنای بچه‌ماهیان در سطح یا نزدیک به سطح آب  
 (۳) تجمع بچه‌ماهیان نزدیک ورودی آب استخر پرورشی  
 (۴) تورم سرپوش آبششی و تلاش برای گرفتن اکسیژن از هوا

-۲۷

در فصل تابستان، چه زمانی مقدار اکسیژن محلول در آب استخراهای پرورش کپورماهیان، به کمترین مقدار می‌رسد؟

- (۱) قبل از غروب آفتاب  
 (۲) هنگام ظهر  
 (۳) صبح

-۲۸



- ۲۹- در خصوص باد زدن آب (**Fanning**) در ماهی، کدام مورد صحیح است؟
- (۱) نمایانگر آغاز یک بیماری است.
  - (۲) نشان دهنده فقدان کنترل و عدم تعادل ماهی است.
  - (۳) حالتی در ماهی بیمار است که بدون هدف در آب حرکت می کند.
  - (۴) از رفتارهای تولید مثلی ماهی است و توسط بالهای سینه‌ای انجام می شود.
- کدام مورد در خصوص درمان دارویی در استخوهای پرورش ماهیان گرم‌آبی، صحیح نیست؟
- ۳۰-
- (۱) دارو باید به آسانی در آب حل شود.
  - (۲) تمام ماهیان از ابتدا درمان می شوند.
  - (۳) ماهیان نباید برای مدت ۲۴ ساعت قبل از درمان تغذیه شوند.
  - (۴) زمانی از روز صورت می گیرد که درجه حرارت آب، در کمترین میزان خود است.
- در مطالعات آبزیان و شیلات، دستگاه مولینه برای اندازه‌گیری کدامیک از موارد زیر در آب، کاربرد دارد؟
- |        |                |
|--------|----------------|
| pH (۲) | سرعت و دبی (۱) |
| EC (۴) | DO (۳)         |
- کدام مورد در خصوص آهن محلول در آب استخهای پرورش ماهیان گرم‌آبی، صحیح نیست؟
- ۳۲-
- (۱) آهن محلول در آب در مقادیر زیاد، در طعم و بوی ماهی تأثیر نامطلوب دارد.
  - (۲) تأثیر آهن بر روی ماهیان، بیشتر از همه، تابع شرایط محیطی و اندازه ماهی است.
  - (۳) بیشترین صدمات آهن، ناشی از رسوب آن بر روی آبشش‌های ماهی است.
  - (۴) آهن محلول با غلظت ۰۰۱٪ میلی گرم بر لیتر برای ماهیان کشنده است.
- بعد از مرحله جمود نعشی در ماهی، کدام ترکیب تشکیل می شود که به عنوان شاخص عمومی فساد در ماهی شناخته شده است؟
- ۳۳-
- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ۲) دی‌متیل‌آمین  | ۱) منومتیل‌آمین  |
| ۴) انبوتیل‌استات | ۳) تری‌متیل‌آمین |
- کدام عامل باکتریایی، با ایجاد سپتیسمی عمومی، باعث تلفات در آزادماهیان می شود و طی سال‌های اخیر، در کشور ایران، در مزارع پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان شیوع داشته است؟
- ۳۴-
- |                |               |
|----------------|---------------|
| ۲) میکسوباکتری | ۱) استرپتوکوک |
| ۴) هموفیلوس    | ۳) پاستورلا   |
- هم‌آوری نسبی در ماهیان، به کدام معنی است؟
- ۳۵-
- (۱) تعداد بچه‌ماهیان در هر مرحله از تاریخ
  - (۲) تعداد تخم در هر مرحله از تخم‌ریزی ماهی
  - (۳) تعداد تخم در ازای یک کیلوگرم وزن بدن ماهی
  - (۴) تعداد لاروهای دارای کیسه زرد بهازای یک کیلوگرم وزن بدن ماهی
- در کدام گونه‌های تاس‌ماهیان، کلیه مراحل زندگی ماهی (بالغ‌ها، بچه‌ماهیان، تخم، مراحل رشد جنینی) در دریاچه‌ها و رودخانه‌های آب شیرین سپری می شود؟
- ۳۶-
- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| ۲) تاس‌ماهیان و تاس‌ماهی روس | ۱) بیشتر تاس‌ماهیان و تاس‌ماهی روس |
| ۴) فیل‌ماهی و تاس‌ماهی ایران | ۳) فیل‌ماهی روس و فیل‌ماهی         |
- میزان مصرف سرانه انواع آبزیان در سال ۱۳۹۶ در کشور ایران، طبق آمار رسمی سازمان شیلات ایران، چند کیلوگرم بوده است؟
- ۳۷-
- |         |         |
|---------|---------|
| ۲) ۲,۱  | ۱) ۱,۲  |
| ۴) ۲۱,۱ | ۳) ۱۱,۲ |
- اولین تک‌یاخته‌ای که در ماهیان شناسایی و بررسی شد و انگلی مژه‌دار بود، به ترتیب، چه نام داشت و عامل کدام بیماری بود؟
- ۳۸-
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| ۲) ژیروداکتیلوس - دهان قرمز  | ۱) میکسوبولوس - روده‌ای     |
| ۴) ایکتیو فتیریوس - لکه سفید | ۳) داکتیلوزیروس - حباب گازی |



- ۴۹- ماهی خاویاری بستر (Bester) دورگه به دست آمده از کدام تلاقي زیر است؟
- (۱) تخمک فیل‌ماهی (*Huso huso*) ماده و اسپرم استرلیاد (*Acipenser ruthenus*) نر
  - (۲) تخمک ازونبرون (*Acipenserstellatus*) ماده و اسپرم فیل‌ماهی (*Huso huso*) نر
  - (۳) تخمک چالباش (*Acipenser gueldenstaedtii*) ماده و اسپرم فیل‌ماهی (*Huso huso*) نر
  - (۴) تخمک استرلیاد (*Acipenser ruthenus*) ماده و اسپرم ماهی خاویاری ایران (*Acipenser persicus*) نر
- عملیات اجرایی بازسازی ذخایر طبیعی آبزیان، در حال حاضر از وظایف قانونی کدام سازمان زیر است؟
- (۱) سازمان دامپزشکی کشور
  - (۲) سازمان شیلات ایران
  - (۳) سازمان حفاظت محیط زیست
  - (۴) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
- با توجه به استاندارد شماره ۲۸۷۰ کنسرو ماهی تون در روغن - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون (سازمان ملی استاندارد ایران)، استفاده از کدام نوع روغن مجاز است؟
- (۱) روغن زیتون بکر
  - (۲) روغن زیتون فرابکر
  - (۳) روغن سویای خالص
  - (۴) روغن‌های خوراکی مصرفی خانوار طبق استاندارد ۹۱۳۱
- ۴۲- در یک کارگاه مداربسته پرورش فوق‌متراکم فیل‌ماهی با تراکم ۸۰ کیلوگرم بر مترمکعب، کنترل کدام‌یک از پارامترهای زیر و نگهداری آن در شرایط بهینه به صورت برخط (On line)، ضروری است؟
- (۱) DO (۲) TSS (۳) TDS (۴) NH<sub>4</sub>
- ۴۳- اگر برای ارزیابی چشممه آب گرم گنو در شمال بندرعباس، ابلاغیه کارشناسی داشته باشد، انتظار یافتن کدام جنس از ماهیان را در آب با دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد دارید؟
- (۱) Aphanius (۲) Perca (۳) Neogobius (۴) Mastacembelus
- ۴۴- در میان ماهیان آب شیرین بومی ایران، کدام جنس از خانواده کپورماهیان (Cyprinidae)، بیشترین پراکنش جغرافیایی را در کشور دارد؟
- (۱) Cyprinion (۲) Chalealburnus (۳) Capoeta (۴) Garra
- ۴۵- کدام‌یک از سس‌ماهیان ایران در رودخانه‌های غرب زاگرس، به طول ۱,۵ متر و وزن بیش از ۸۰ کیلوگرم می‌رسیده است؟
- (۱) Barbus barbus (۲) Barbus esocinus (۳) Barbus capito (۴) Barbus grypus
- ۴۶- در صورتی که امکان نگهداری نمونه آب در شرایط سرد، پس از نمونه‌برداری از یک مزرعه پرورش ماهی و یا تثبیت نمونه طبق استاندارد وجود نداشته باشد، اندازه‌گیری کدام پارامتر زیر، باید در سریع‌ترین زمان ممکن و ترجیحاً در محل مزرعه انجام شود؟
- (۱) pH (۲) قلیائیت (۳) مواد رادیواکتیو (۴) سختی کل
- ۴۷- برای پی بدن به آلودگی میکروبی منبع آب چاه با منشأ فاضلاب انسانی در یک مزرعه پرورش ماهی، از کدام آزمون‌های زیر، می‌توان استفاده کرد؟
- (۱) NO<sub>3</sub> و NO<sub>2</sub> (۲) COD و BOD<sub>5</sub> (۳) Total Coliform و Fecal Coliform (۴) NH<sub>4</sub> و NH<sub>3</sub>
- ۴۸- با توجه به مقررات جاری در کشور، در حال حاضر اجازه پرورش ماهی به کدام گونه زیر، در استان‌های گلستان، مازندران و گیلان داده نمی‌شود؟
- (۱) تیلاپیا - بستر (۲) ازونبرون - قرهبرون (۳) فیل‌ماهی - چالباش (۴) فیتوفاگ - بیگهد

- ۴۹ برای تعیین سن ماهیان یک حوضچه پرورش ماهی از گونه کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) در استان مازندران، با بررسی کدامیک از موارد زیر، می‌توان به تخمین نزدیک به واقعیت رسید؟

  - (۱) اولین اشعه سخت باله پشتی
  - (۲) تعداد دندان حلقوی
  - (۳) اولین اشعه سخت باله سینه‌ای
  - (۴) فلس

کدام گونه‌های زیر، صدف مرواریدساز بوده و در خلیج فارس صید می‌شوند؟

  - (۱) *Iranocypris typhlops* و *Iranocichla hormuzensis*
  - (۲) *Heteropneustes fossilis* و *Glyptothorax silviae*
  - (۳) *Pinctada margaritifera* و *Pinctada vulgaris*
  - (۴) *Capoeta tetrazona* و *Capoeta capoeta*

کدام گونه‌های ماهی بومی ایران در استان خوزستان، از خانواده کپورماهیان (Cyprinidae)، جزو ماهیان پُرارزش برای مصرف خوراکی و دارای قابلیت‌های تکثیر و پرورش برای ورود به صنعت آبزی پروری به حساب می‌آیند؟

  - (۱) ماهی کپور معمولی (*Labeo rohita*) و ماهی روهو (*Cyprinus carpio*)
  - (۲) ماهی بنی (*Barbus grypus*) و ماهی شیربت (*Barbus sharpeyi*)
  - (۳) ماهی کاتلا (*Catla catla*) و ماهی بنی (*Barbus sharpeyi*)
  - (۴) ماهی شیربت (*Barbus grypus*) و ماهی کاتلا (*Catla catla*)

کدامیک از ماهی‌های زیر، دو باله پشتی دارند؟

  - (۱) *Barbus mursa* (۲)
  - (۲) *Alburnoides bipunctatus*
  - (۳) *Mugil cephalus* (۴)
  - (۴) *Cyprinodon watsoni*

پنج ردیف پلاک‌های استخوانی که در طول بدن ماهی کشیده شده، چهار سبیلک در یک ردیف عرضی در جلوی دهان و پوزه نسبتاً کشیده، از خصوصیات کدامیک از خانواده‌های زیر است؟

  - (۱) *Acipenseridae* (۲)
  - (۲) *Gobiidae*
  - (۳) *Polyodontidae*
  - (۴) *Siluridae*

در تفريخگاه‌های کشورهای اطراف دریای خزر و آзов، از جمله ایران، از کدام دستگاه برای تفريخ تخم ماهیان خاویاری استفاده می‌شده است؟

  - (۱) Seth Green (۲)
  - (۲) Yushchenko
  - (۳) Veis (۴)
  - (۴) Zug

ضریب غذایی (FCR) در یک کارگاه پرورش ماهی قزلآلای رنگین‌کمان، در صورت مصرف ۹۵۰ کیلوگرم غذا برای تولید یک تن ماهی، چقدر است؟

  - (۱) ۰,۰۹۵
  - (۲) ۰,۰۹۵
  - (۳) ۰,۹۵
  - (۴) ۰,۹۵

آیین‌نامه اجرایی ماهیگیری مسئولانه (Code of Conduct for Responsible Fisheries) که به اتفاق آرا در ۳۱ اکتبر ۱۹۹۵ میلادی در اجلاس FAO تصویب شد، با کدام مورد در تناقض است؟

  - (۱) احترامی در خور توجه برای اکوسیستم و تنوع زیستی قائل است.
  - (۲) بر حصول اطمینان از حفاظت، مدیریت و توسعه مؤثر منابع آبی زنده، اتکا نموده است.
  - (۳) الزامات قانونی را یادآوری می‌کند، به طوری که برای عدم رعایت الزامات اکوسیستمی و تنوع زیستی، جریمه‌های مشخص تعیین شده است.
  - (۴) به شیوه‌ای غیردستوری، اصول و استانداردهای کاربردی برای حفاظت، مدیریت و توسعه انواع ماهیگیری را در تمام حوزه‌های تحت بهشش، بیان می‌داهد.

-۵۷ در مزرعه‌ای خاکی که مورد بازدید کارشناس رسمی دادگستری در رشته آبزیان و شیلات قرار گرفته، فقط آثاری از اسکلت و استخوان‌های کامل ناحیه سر تعدادی ماهی در حوضچه پرورش ماهی باقی مانده است. از کدام طریق نمی‌توان پی برد چه گونه‌ای در استخر پرورش داده می‌شده است؟

(۱) فرمول دندان حلقی چهاردردیفی، نشان‌دهنده ماهی کپور نقره‌ای است.

(۲) فرمول دندان حلقی ۳.۱.۱-۱.۱.۳ نشان‌دهنده ماهی کپور معمولی است.

(۳) دندان‌های حلقی نشان‌دهنده این است که کپور ماهیان پرورش داده می‌شوند.

(۴) تعداد مهره‌های ستون فقرات و تعداد فلس‌های روی خط جانبی نشان‌دهنده گونه ماهی است.

-۵۸ طبق استاندارد شماره ۵۷۶۷ آیین کار واحدهای تولیدی ماهی شور (سازمان ملی استاندارد ایران)، مقدار مصرف روناس به عنوان ماده رنگی با منشأ گیاهی، چند درصد وزن ماهی است؟

(۱) بین ۶ تا ۷ کمتر از یک

(۲) بین ۴ تا ۵

(۳) کدامیک از ماهیان زیر، از خانواده سیچلیده (*Cichlid Fish*) نیست؟

(۱) آنجل (فرشتهدماهی)

(۲) دیسکس

(۳) فایتر

(۴) اسکار

-۵۹ برای فیکس کردن اولیه ماهی‌ها، معمولاً از فرمالین ۳٪ درصد خالص استفاده می‌شود. در آزمایشگاه برای تهییه فرمالین ۱۰ درصد و فیکس کردن ماهی خیاطه (*Alburnoides bipunctatus*), کدام ترکیب زیر استفاده می‌شود؟

(۱) ۹ قسمت فرمالین و ۱ قسمت الکل اتیلیک ۷° درجه

(۲) ۱ قسمت فرمالین و ۹ قسمت الکل اتیلیک ۷° درجه

(۳) ۹ قسمت فرمالین و ۱ قسمت آب مقطر

(۴) ۱ قسمت فرمالین و ۹ قسمت آب مقطر

-۶۰ برای فیکس کردن اولیه ماهی‌ها، معمولاً از فرمالین ۳٪ درصد خالص استفاده می‌شود. در آزمایشگاه برای

استفاده می‌شود؟

کلید سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸

آبزیان و شیلات

شماره سوال	گزینهٔ صحیح	شماره سوال	گزینهٔ صحیح
۱	۲	۳۱	۱
۲	۳	۳۲	۴
۳	۱	۳۳	۳
۴	۴	۳۴	۱
۵	۳	۳۵	۳
۶	۳	۳۶	۲
۷	۲	۳۷	۳
۸	۴	۳۸	۴
۹	۱	۳۹	۱
۱۰	۲	۴۰	۲
۱۱	۱	۴۱	۴
۱۲	۴	۴۲	۱
۱۳	۳	۴۳	۱
۱۴	۴	۴۴	۳
۱۵	۲	۴۵	۴
۱۶	۱	۴۶	۲
۱۷	۱	۴۷	۳
۱۸	۳	۴۸	۱
۱۹	۲	۴۹	۴
۲۰	۴	۵۰	۳
۲۱	۳	۵۱	۲
۲۲	۱	۵۲	۴
۲۳	۴	۵۳	۲
۲۴	۲	۵۴	۱
۲۵	۲	۵۵	۳
۲۶	۳	۵۶	۳
۲۷	۱	۵۷	۴
۲۸	۳	۵۸	۲
۲۹	۴	۵۹	۱
۳۰	۲	۶۰	۴



کوہاپا