

ماساژ چند تنفس می دهیم ۳۰ بعد از CPR در

تنفس ۱

تنفس ۲

تنفس ۳

تنفس ۴

## سوال ۲

شامل چه اقداماتی می شود (cpr) احیای قلبی ریوی

شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم قلب و ریه انجام میشود  
شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم مغز و قلب انجام میشود  
شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم مغز و ریه انجام میشود  
شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی عضو مهم قلب انجام میشود

## سوال ۳

آئزین صدري عبارت است از

درد قفسه سينه که از قلب برخاسته باشد  
درد جناغ سينه که از پهلو برخاسته باشد  
درد در ناحیه رگ های خون رسان قلب  
همه موارد

## سوال ۴

عوارض فشارخون بالا چیست

پارگی مویرگهای مغزی یا قلبی

پارگی شبکه چشم

خونریزی اندام های دیگر

همه موارد

اجزای اصلی دستگاه گردش خون عبارتند از

قلب، کلیه، خون

رگ ها، کلیه ها، خون

قلب، رگ ها، خون

رگ ها، مغز، خون

### سوال ۶

چه هنگام خفگی روی می دهد

هر گاه به هر دلیل هوای اکسیژن دار نتواند داخل ریه ها شود

در هوای دم و بازدم اختلال ایجاد شود

در تبادل اکسیژن بین خون و بافت ها اختلال ایجاد گردد

همه موارد



### سوال ۷

عمق فشار فشردن قفسه سینه در نوزادان چقدر می باشد

یک سانتیمتر

دو سانتیمتر

سه سانتیمتر

چهار سانتیمتر



### سوال ۸

شما به عنوان یک امدادگر با نوزادی که دچار بیهوشی شده است برخورد می نمایید ، اولین اقدام شما چیست؟

گرفتن نبض

ارزیابی تنفس و گردش خون

دادن تنفس

ماساژ قلبی

فشار خون بر روی چه پارامترهایی می باشد

قطر عروق

حجم خون اگر خون زیاد باشد، فشار خون بالاست

قدرت انقباض قلب

همه موارد

### سوال ۱۰

قرمزی و التهاب در پوست به همراه درد، ایجاد ترشح و التهاب مربوط به کدام یک از درجه های سوختگی است؟

درجه یک

درجه دو

درجه سه

موارد الف و ب

### سوال ۱۱

کننده حتماً باید ..... باشد CPR شانه فرد

عمود بر بیمار

راستای فشار عمود بر استرنوم باشد

عمود بر قلب بیمار

گزینه الف و ب

### سوال ۱۲

کدام یک از جمله های زیر صحیح است

از روش چهار میج زمانی استفاده می شود که مصدوم به هوش است و دست هایش هم صدمه ندیده است

هنگام حمل گروهی مصدوم، یکی از امدادگران باید مراقب سرو گردن مصدوم باشد

در روش حمل عصایی باید مصدوم با دست خود امدادگر را بگیرد تا دست های امدادگر برای حمل

وسایل و انجام اقدام های لازم آزاد باشد

موارد الف و ب صحیح است

عمق فشار فشردن قفسه سینه در بالغین چقدر می باشد

حداقل ۳ تا حداکثر ۴

حداقل ۴ تا حداکثر ۵

حداقل ۵ تا حداکثر ۶

حداقل ۶ تا حداکثر ۷

## سوال ۱۸

سنگوپ چیست

از دست دادن موقت هوشیاری و بیهوشی در نتیجه نرسیدن خون کافی به مغز (کوتاه مدت) می باشد  
از دست دادن موقت هوشیاری و بیهوشی در نتیجه نرسیدن خون کافی به قلب (کوتاه مدت) می باشد  
از دست دادن موقت هوشیاری و بیهوشی در نتیجه نرسیدن خون کافی به ریه (کوتاه مدت) می باشد  
از دست دادن موقت هوشیاری و بیهوشی در نتیجه نرسیدن خون کافی به کلیه (کوتاه مدت) می باشد

## سوال ۱۹

... تعریف خونریزی داخلی

چنانچه خون پس از خروج از رگ در داخل حفره ای از بدن ریخته و محل خونریزی مشاهده نشود  
چنانچه خون پس از خروج از رگ در داخل حفره ای از بدن ریخته و محل خونریزی مشاهده شود  
چنانچه بیمار دچار تهوع و استفراغ های مکرر باشد  
خون از درون عروق خارج شده، ولی داخل بدن باقی میماند

## سوال ۲۰

چرا خوردن، نوشیدن یا سیگار کشیدن برای مصدوم آسیب به سر ممنوع است؟

ممکن است بیهوش شود

شاید در بیمارستان نیاز به بیهوشی داشته باشد

خون او غلیظ شود

فشار خون کم شود

فشار خون بر روی چه پارامترهایی می باشد

قطر عروق

حجم خون اگر خون زیاد باشد، فشار خون بالاست

قدرت انقباض قلب

همه موارد

## سوال ۱۰

قرمزی و التهاب در پوست به همراه درد، ایجاد ترشح و التهاب مربوط به کدام یک از درجه های سوختگی است؟

درجه یک

درجه دو

درجه سه

موارد الف و ب

**سوال ۱۱**

کننده حتماً باید ..... باشد CPR شانه فرد

عمود بر بیمار

راستای فشار عمود بر استرنوم باشد

عمود بر قلب بیمار

گزینه الف و ب



**سوال ۱۲**

کدام یک از جمله های زیر صحیح است

از روش چهار مچ زمانی استفاده می شود که مصدوم به هوش است و دست هایش هم صدمه ندیده است

هنگام حمل گروهی مصدوم، یکی از امدادگران باید مراقب سرو گردن مصدوم باشد

در روش حمل عصایی باید مصدوم با دست خود امدادگر را بگیرد تا دست های امدادگر برای حمل

وسایل و انجام اقدام های لازم آزاد باشد

موارد الف و ب صحیح است

