




# سوالات تخصصی آزمون استخدام

## وزارت بهداشت ۱۴۰۲

(مامایی)

(ارسالی کاربران)




سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

[Www.IranEstekhdam.Ir](http://www.IranEstekhdam.Ir)

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن  
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: [soal@iranestekhdam.ir](mailto:soal@iranestekhdam.ir) 

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۰۱۳ 

[Www.IranStekhdam.Ir](http://www.IranStekhdam.Ir)

## «توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه  
به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

**اینجا کلیک نمایید**

## بارداری و زایمان ۱ و ۲

- ۹۱- خون ریزی فاعده‌گی در چه مرحله‌ای از سیکل تخمک‌گذاری رخ می‌دهد؟  
 الف) هفته دوم سیکل تکثیری  
 ب) هفته اول سیکل ترشحي  
 ج) هفته اول سیکل تکثیری  
 د) هفته دوم سیکل ترشحي
- ۹۲- در معاینه وازینال خانمی G3P2 در لیبر فاصله بین اربت‌ها و فونتانلی قدسی به دست می‌خورد. تشخیص چه نوع پروژاناسیونی است؟

الف) مرکب  
 ب) پستانی  
 ج) صورت  
 د) ورتکس

- ۹۳- درباره فیزیولوژی سیکل تخمدانی عبارت غلط کدام است؟  
 الف) در اواخر دوره فولیکولی LH تولید اندروژن‌ها توسط سلول‌های تکا را تحریک می‌کند.  
 ب) LH موجب افزایش گیرنده‌های خود و تبدیل اندروستندین به استرادیول می‌شود.  
 ج) با رشد فولیکول‌های آنترال سلول‌های استرومایی مخاطه‌کننده آنها به سلول‌های تکا تبدیل می‌شوند.  
 د) اوج ترشح استروژن حدود ۲۶ ساعت و اوج ترشح LH حدود ۱۲ ساعت قبل از تخمک‌گذاری است.
- ۹۴- در کدامیک از موارد زیر تولید استروژن جفتی افزایش می‌یابد؟

الف) تریزومی ۲۱  
 ب) آرتروپلاستوز جنینی  
 ج) کمبود آروماتاز جفتی  
 د) بیماری تروفوبلاستیک

- ۹۵- تحرک زود هنگام پس از زایمان از چه مزیتی برخوردار است؟  
 الف) کاهش بیوست  
 ب) ترمیم سریع ترابی زایمانی  
 ج) افزایش ترشح شیر از پستان  
 د) کاهش طول مدت دفع لوسیا

- ۹۶- کمست‌های تکا - لوتئینی در کدام بارداری مشاهده نمی‌شود؟

الف) مول  
 ب) ایروایمونیزاسیون D  
 ج) دیابت  
 د) هیپوتیروئیدی

- ۹۷- درد مادر باردار طی مراحل مختلف زایمان منجر به کدام اختلال متابولیکی زیر می‌شود؟  
 الف) اسیدوز متابولیک  
 ب) آلکالوز متابولیک  
 ج) اسیدوز تنفسی  
 د) اختلال مخلوط اسید - باز

- ۹۸- در کدامیک از موارد زیر تاکیکاردی قلبی جنین مشاهده می‌شود؟  
 الف) بلوک مادرزادی قلب جنین  
 ب) هیپوترمی مادر  
 ج) بیلوئفتریت شدید مادر  
 د) تزریق آتروپین به مادر

- ۹۹- خانمی در طی بارداری دچار اورتریت و عفونت غده بارتولین بوده است. پس از زایمان که ۲۷ هفته انجام شده، نوزادش مبتلا به عفونت چشمی شده است. تشخیص شما چیست و این خاتم در بارداری باید چه درمانی دریافت می‌کرد؟

الف) کلایدیا اریترومایسین  
 ب) گنوره اسفتریاکون  
 ج) لنفوگرتولوم و تروم آ ازیترومایسین  
 د) شانکروئید ازیترومایسین

- ۱۰۰- نمای میکروسکوپی موکوس سرویکس در بارداری چگونه و در اثر کدام هورمون است؟

الف) سرخسی، پروژسترون  
 ب) سرخسی، استروژن  
 ج) دانه تسییحی، پروژسترون  
 د) دانه تسییحی، استروژن

## بارداری و زایمان ۳ و ۴

- ۱۰۱- کدامیک از اقدامات زیر در موقعیت ابتلای به آمبولی مایع آمیون صحیح می‌باشد؟

الف) انجام احیاء قلبی - ریوی  
 ب) حفظ درجه حرارت در سطح ۳۸ درجه سانتی‌گراد  
 ج) حفظ میانگین فشار شریانی در سطح ۹۵ میلی‌متر جیوه  
 د) تجویز مایعات برای اتساع یطن راست

۱۰۲- چنانچه شروع علائم بالینی آبله مرغان (varicella) در مادر باردار ۲ روز قبل از زایمان یا ۲ روز پس از آن باشد، اقدام ضروری چیست؟

- الف) ایمونوگلوبولین زوستر به نوزاد تزریق شود
- ب) درمان دارویی برای نوزاد تزریق شود
- ج) ایمونوگلوبولین زوستر به مادر باردار تزریق شود
- د) وپروس آبله مرغان قابل سرایت به نوزاد نیست

۱۰۳- محل تزریق واکسن B.T. کدام است؟

- الف) زیرجلد بازو
- ب) درون پوست /ساعد
- ج) داخل عضله بازو
- د) داخل جلد بازو

B توصیه نمی شود؟

- الف) کمتر از ۲۲ هفته
- ب) ۲۴ هفته تا ۳۱ هفته کامل
- ج) ۳۲ هفته تا ۳۳ هفته کامل
- د) ۳۴ هفته و بیشتر

۱۰۵- در دایلم رنگی خانم باردار نمای «حلقه آتش» دیده می شود. کدامیک از تشخیص های زیر محتمل است؟

- الف) سقط خودبخود
- ب) حاملگی اکتیویک
- ج) مول هیداتیدفرم
- د) سقط ناقص

۱۰۶- کدامیک از موارد زیر از کنترااندیکاسیون های مصرف گنادوتروپین در درمان ناباروری است؟

- الف) لقای تخمک گذاری در افراد مبتلا به هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک
- ب) سوپراوولاسیون در همراهی با LH
- ج) نارسایی اولیه تخمدان با میزان بالای FSH
- د) لقای تخمک گذاری در PCOS همراه با فقدان تخمک گذاری

۱۰۷- در جواب آزمایش پاپ اسمیر خانم یانسه ای وجود سفول های آندوسرویکال گزارش شده است. اقدام بعدی چیست؟

- الف) اقدامی ندارد
- ب) تکرار پاپ اسمیر
- ج) کولپوسکوپی
- د) بیوپسی اندومتر

۱۰۸- مکانیسم کاهش باروری در آندومتر یوز متوسط یا شدید چیست؟

- الف) چسبندگی در ناحیه تخمدان ها و لوله های رحمی
- ب) نارسایی فولیکولار
- ج) سیکل های نامنظم قاعدگی
- د) افزایش میزان E2 خون در مرحله قبل از تخمک گذاری

۱۰۹- خانمی ۲۴ ساله با سابقه ۳ سقط مکرر و آنتی بادی کاردیولولین مثبت مراجعه کرده است. درمان پیشنهادی در حاملگی بعدی کدام است؟

- الف) دوز کم آسپرین به اضافه استروئیدها
- ب) دوز کم آسپرین به اضافه ویتامین C
- ج) دوز کم آسپرین به تنهایی
- د) دوز کم آسپرین به اضافه هپارین

۱۱۰- برای کاهش درد به روش دکتر دیکرید (Dick Read) تأکید بر کدام است؟

- الف) شرطی کردن درد زایمان
- ب) افزایش تحرکات برای سرگرمی مادر
- ج) کاهش ترس از زایمان
- د) اختلال در مسیر درک درد

**بیماری های زنان و ناباروری**

۱۱۱- برای نمونه برداری از آندومتر جهت بررسی علل نازایی، کدام زمان از سیکل قاعدگی مناسب است؟

- الف) اوایل فاز تکثیر رحم
- ب) یک روز قبل از تخمک گذاری
- ج) اواسط فاز لوتئینی تخمدان
- د) اواخر فاز ترویحی رحم

۱۱۲- خانمی ۲۸ ساله با درد زیر شکم در سمت راست مراجعه نموده است. در مشاهدات سونوگرافی توده ای نوپر به قطر

۶×۵ سانتی متر در تخمدان راست مشاهده می شود. کدام اقدام ارجح است؟

- الف) تحت نظر داشتن بیمار و معاینات مکرر هر ۶ ماه یکبار
- ب) لاپاراتومی و برداشتن توده
- ج) تجویز OCP و تکرار سونوگرافی سه هفته بعد
- د) تکرار سونوگرافی

۱۳۴- کدام شاخص به منظور بررسی تأثیر مصرف روزانه ۲ عدد قرص آهن طی یک ماه در مادر بارداری که در سه ماهه دوم بارداری اشی دارای هموگلوبین ۱۰ میلی گرم در دسی لیتر بوده، صحیح است؟  
 الف) متوسط حجم گلبولی  
 ب) افزایش حجم رتیکولوسیتها  
 ج) فریتین  
 د) سطح سرمی آهن

۱۳۵- طبق دستورالعمل کشوری در مورد کودک سالم، کدامیک از موارد زیر در مورد تغذیه شیرخوار با شیر مادر صحیح نیست؟  
 الف) طی هفته اول تولد، اگر کودک خودش در شب بیدار نشود، باید او را بعد از ۳ ساعت جهت شیردهی بیدار نمود.  
 ب) طی هفته اول تولد، ۸-۱۰ بار شیردهی در ۲۴ ساعت کافی می باشد.  
 ج) ۱ هفته تا ۶ هفته، حداقل ۸ بار شیردهی در ۲۴ ساعت کافی می باشد.  
 د) طی ۸-۷ ماهگی، حداقل ۸ بار شیردهی در ۲۴ ساعت کافی می باشد.

### نوزادان

۱۳۶- اولین و شایع ترین نشانه دیسترس تنفسی در نوزادان کدام است؟  
 الف) رتراکسیون قفسه سینه  
 ب) سیانوز  
 ج) تنفس بیش از ۶۰ بار در دقیقه  
 د) صدای ناله انتهایی دمی

۱۳۷- عامل مؤثر بر امتیاز آپگار منفی کدام است؟  
 الف) سولفات منیزیم  
 ب) نوروپاتی مادرزادی  
 ج) آنوری کوان  
 د) اسپدوز مادر

۱۳۸- در هنگام بررسی نوزاد دختر، کدام یافته غیرطبیعی محسوب می شود؟  
 الف) خوتربیزی از واژن  
 ب) عدم دفع مکنویم در ۲۴ ساعت اول  
 ج) بزرگی کلیتوریس و برجسته بودن لب های کوچک  
 د) نرم و سفید پستان ها

۱۳۹- عارضه گرن ایکتروس از پیامدهای عدم کنترل کدام بیماری در نوزاد است؟  
 الف) گالاکتوزمی  
 ب) فنیل کتونوری  
 ج) هیپوتیروئیدسم مادرزادی  
 د) هیپر بیلی روبینمی

۱۴۰- در معاینه چشم نوزاد میکروسفال تازه متولد شده، اسکار ماکولا و لکه های کوچک در شبکه مشاهده شده است. محتمل ترین علت کدام است؟  
 الف) پاروویروس  
 ب) ویروس زیکا  
 ج) سوء تغذیه دوران بارداری  
 د) ترومای شدید مادر در دوران بارداری

۱۴۱- علت اورویاتی انسدادی در نوزاد کدام است؟  
 الف) سندرم مثانه بزرگ، کولون کوچک، کاهش پرستانتسیم روده ای  
 ب) هیدروپوتر و نفروز دوطرفه  
 ج) اولیگو هیدرو آمینوس  
 د) هیپوبلازی ریبی

۱۴۲- کدامیک از حملات زیر در خصوص پلتورا صحیح است؟  
 الف) در نوزادان پره ترم شایع است.  
 ب) در پلی ستمی دیده می شود.  
 ج) ناشی از کم خونی است.  
 د) در نتیجه ضخیم شدن پوست اتفاق می افتد.

۱۴۳- در معاینه چشم نوزادی قطر قرینه بیش از یک سانتی متر است و فوتوفوبی و اشک ریزش مشاهده می شود. کدام عارضه بیشتر مطرح است؟  
 الف) کاناراکت  
 ب) کوریوریتیت  
 ج) گلوکوم  
 د) رتینوپاتی نارس

۱۴۴- ادم لوکالیزه در نوزاد کدام یک از موارد زیر را بیشتر مطرح می کند؟  
 الف) نارس بودن  
 ب) کوریوریتیت  
 ج) هیپرتانرمی ثانویه به اریتروبلاستوز  
 د) ناهنجاری مادرزادی غدد لنفاوی

۱۳۵۰۵۷۸

۱۱۳- در خانمی هیپوتیروئید با مشکل DUB احتمال کدام عارضه بیشتر است؟

- الف) متورزی
- ب) اولیگوامنوره
- ج) آمنوره
- د) هیومنوره

۱۱۴- مددجو با شکایت دیسمنوره دیسپارونی - درد لگنی و نازایی مراجعه نموده و دارای طول سیکل کوتاه شده و مدت قاعدگی طولانی است. تشخیص احتمالی کدام است؟

- الف) PID
- ب) اندومترئوز
- ج) اندومیوز
- د) سالیسیت

۱۱۵- کدام یک از موارد زیر از تشخیص های افتراقی منارک زودرس نیمی باشد؟

- الف) سننرم مک کال - البرایت
- ب) هیپرتیروئیدی اولیه
- ج) تروما
- د) سوء استفاده جنسی

۱۱۶- دختری ۱۲ ساله با دردهای کولیکی و گرامپ های سوپرابوییک و تشخیص دیسمنوره اولیه مراجعه نموده است. درمان انتخابی چیست؟

- الف) نورکتومی
- ب) قرص OCP
- ج) انس پروستاگلندین
- د) طب سوزنی

۱۱۷- در ارتباط با تشخیص لیومیوم زیر مخاطی کدام روش مناسب نیست؟

- الف) هیستروسکوپی
- ب) اولتراسونوگرافی
- ج) سونوهیستروگرام
- د) هیستروئینگوگرام

۱۱۸- برای غربالگری سرطان تخمدان، انجام کدام روش به صورت ترکیبی پیشنهاد می شود؟

- الف) CA-125 / سونوگرافی / معاینه فیزیکی
- ب) LDH / لاپاروسکوپی
- ج) HCG / سونوگرافی / لاپاروسکوپی
- د) AFP / معاینه فیزیکی / سونوگرافی

۱۱۹- بیشترین احتمال CIN در چه زمانی است؟

- الف) در زمان استفاده از OCP
- ب) یائسگی
- ج) پانگی
- د) قبل از حاملگی

۱۲۰- کدامیک از موارد زیر درباره خطر ابتلا به سرطان پستان صحیح است؟

- الف) با افزایش سن زنان، خطر ابتلا آنان به سرطان پستان کاهش می یابد.
- ب) هرچه دوران تولدمثل زنان طولانی تر باشد، خطر ابتلا به سرطان پستان کاهش می یابد.
- ج) سابقه خانوادگی سرطان پستان، از عوامل خطر کاملاً شناخته شده ابتلا به سرطان است.
- د) پانگی زودرس در زنان، باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان می شود.

### بهداشت مادر و کودک

۱۲۱- خانمی با نوزاد ۲۳ روزه، بیان می کند که از روز پنجم پس از زایمان، احساس خمگینی اش شروع شده است. او انرژی کمی برای مراقبت از نوزاد دارد و گهگاهی گریه می کند. تشخیص احتمالی و اقدام مناسب یک ما ما چیست؟

- الف) افسردگی پس از زایمان - ارجاع به متخصص روان
- ب) سایکوز پس از زایمان - ارجاع به متخصص روان
- ج) لوده بیجه - ارجاع به متخصص روان
- د) لوده بیجه - ویزیت مجدد هفته بعدی

۱۲۲- جهت مبارزه با کمبود روی در کودکان، رایج ترین حامل غذایی برای اضافه کردن روی کدام است؟

- الف) شکر
- ب) گندم
- ج) شیر خشک
- د) آرد غلات

۱۲۳- جهت کمک به پیاده سازی سیاست های کلی جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مناسب ترین رویکرد آموزش بهداشت کدام است؟

- الف) رویکرد قانونی
- ب) رویکرد خدماتی
- ج) رویکرد آموزشی
- د) رویکرد مراقبت های بهداشتی اولیه

۱۲۴- سبگار کشیدن همراه داشتن سابقه فامیلی به عنوان کدام عامل خطر در بروز سرطان پستان محسوب می شود؟  
 الف) Proxy for need  
 ب) تشدید  
 ج) علیش  
 د) تجمعی

۱۲۵- آموزش روش انجام خودآزمایی پستان بر روی ماکت به زنان مراجعه کننده جهت دریافت مراقبت های سلامت باروری به مراکز بهداشتی چه نام دارد؟  
 الف) نقش بازی  
 ب) نمایش عملی  
 ج) تمرین شبیه سازی  
 د) آموزش برنامه ریزی شده

۱۲۶- غربالگری سرطان سرویکس در طبقات اجتماعی پایین جامعه چه نوع غربالگری است؟  
 الف) صحنی  
 ب) تجویزی  
 ج) انتخابی  
 د) چند مرحله ای

۱۲۷- همه موارد زیر از اهداف برنامه کشوری صندوق جمعیت ملل متحد است، به جز:  
 الف) تأمین حقوق باروری برای همه زوجین  
 ب) ارتقاء و پایش عهدنامه حقوق کودک  
 ج) کاهش نابرابری جنس و زن و مرد  
 د) بهبود وضعیت بهداشت باروری

۱۲۸- طبق دستورالعمل کشوری در مورد کودک سالم، واریش فلوراید برای کودک از چه زمانی و هر چند ماه یکبار لازم است انجام شود؟  
 الف) از سه سالگی، هر شش ماه  
 ب) از دو سالگی، هر یک سال  
 ج) از دو سالگی، هر یک سال  
 د) از سه سالگی، هر یک سال

۱۲۹- در الگوی جامع آموزش بهداشت، تعیین اهداف ویژه عملیاتی، تدوین فعالیت ها، تعیین منابع و تدوین مراحل ارزشیابی در کدام مرحله صورت می گیرد؟  
 الف) تعیین اهداف  
 ب) تعریف مشکلات  
 ج) طراحی برنامه  
 د) فعالیت های اجرایی

۱۳۰- چنانچه بخواهیم در یک مادر تک فرزند با تغییر نگرش، تقویت احساس کارایی فردی و نقش دیگران مهم، قصد او را در جهت فرزندآوری بیشتر، تقویت کنیم، با کاربست کدام تئوری اقدام به تغییر رفتار می کنیم؟  
 الف) مدل اعتقادی بهداشتی  
 ب) الگوی مراحل تغییر  
 ج) نظریه یادگیری اجتماعی  
 د) تئوری رفتار برنامه ریزی شده

۱۳۱- در الگوی برنامه ریزی پرسیسید - پروسیسید، ارزشیابی تأثیرات بلندمدت برنامه همانند تغییر در کیفیت زندگی و شاخص های بهداشتی کدام نوع ارزشیابی است؟  
 الف) ارزشیابی مرحله اجرا  
 ب) ارزشیابی فرایند  
 ج) ارزشیابی نتیجه  
 د) ارزشیابی تأثیر

۱۳۲- در جامعه ای اطلاعات زیر وجود دارد:  
 تعداد تولد زنده در سال: ۷۰۰۰ مورد / تعداد موارد مرگ نوزاد از بدو تولد تا ۷ روزگی: ۲۵ مورد / تعداد مرگ نوزاد تا ۲۸ روزگی: ۵۰ مورد / تعداد موارد مرگ از ۲۸ روزگی تا یکسالگی: ۲۵ مورد.  
 همه شاخص های زیر قابل محاسبه است، بجز:  
 الف) PMR  
 ب) NMR  
 ج) PNMR  
 د) IMR

۱۳۳- کودک متولد شده در ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ و بدون سابقه قبلی واکسیناسیون، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ به مرکز جهت تزریق واکسن آورده شده است. در این مراجعه چه واکسن هایی به این کودک باید تزریق شود؟  
 الف) سه گانه، هپاتیت ب، فلج اطفال خوراکی، فلج اطفال تزریقی، MMR  
 ب) پنتاوالان، فلج اطفال خوراکی، فلج اطفال تزریقی، MMR  
 ج) سه گانه، هپاتیت ب، فلج اطفال خوراکی، MMR  
 د) پنتاوالان، فلج اطفال خوراکی، MMR

۱۵۵- طی فرآیند تکوین قلب کدام ساختار زیر از شاخ سینوسی چپ به وجود می آید؟

- الف) تریکورد ورید اجوف تحتانی
- ب) سینوس کروناری
- ج) سینوس وراورم
- د) شیبغ انتهایی

۱۵۶- باقی ماندن مجرای دهلیزی - بطنی اولیه (Persistent atrioventricular canal) با همه ناهنجاری های زیر

- الف) نقص دیواره بین بطنی
- ب) نقص دیواره بین دهلیزی
- ج) نقص دریچه های سپتی
- د) نقص دریچه های سه لته و دو لته

۱۵۷- قسمت تحتانی مجرای مزونفروس در جنس مونث در حین تکامل می تواند کدامیک از ساختارهای زیر را به وجود

- الف) Epoophoron
- ب) Appendix testis
- ج) Paroophoron
- د) Gartner's cyst

۱۵۸- در صورتی که با حرکات جنین، ضربان قلب جنین افزایش نیابد، تفسیر شما به عنوان عاما کدام است؟

- الف) Reactive
- ب) Nonreactive
- ج) رضایت جنین نیست
- د) طبیعی است

۱۵۹- برای ارزیابی رشد ریه های جنین کدام روش ارزیابی را توصیه می کنید؟

- الف) اولتراساوند
- ب) نمونه گیری از بزرگ های کوربون
- ج) آمنیوسنتز
- د) الکتروکاردیوگرافی

۱۶۰- رباط گرد کبیدی در اثر بسته شدن کدام ساختار زیر به وجود می آید؟

- الف) ورید آلفی
- ب) شریان نافی
- ج) مجرای وریدی
- د) مجرای شریانی

۱۶۱- کدام مرحله جنینی حساس ترین دوره زندگی درون رحمی نسبت به عوامل موانعوزن است؟

- الف) مرحله پیش از لانه گذاری
- ب) طی مدت زمان لانه گذاری
- ج) هفته سوم تا هفتم حاملگی
- د) هفته نهم تا پایان حاملگی

۱۶۲- کدامیک از موارد زیر علت رقیق شدن موکوس گردن رحم را بیان می کند؟

- الف) افزایش کوربون استروژن
- ب) کاهش ترشح غدد رحمی
- ج) زیاد شدن آلیس فولیکولی
- د) کاهش جریان خون سرخرگ های رحمی

۱۶۳- بزرگ های اولیه در حین تکامل جفت در کدام هفته تشکیل می شوند؟


- الف) چهارم
- ب) سوم
- ج) دوم
- د) اول

۱۶۴- به منظور ارزیابی سلامت جنین در حاملگی چندقلو کدام اقدام ممنوع است؟

- الف) مارتینوگراف خارجی جنین
- ب) تست استرس
- ج) تست بدون استرس
- د) آمنیوسکوپی

۱۶۵- بهترین زمان بررسی آنومالی های جنین کدام است؟

- الف) ۱۷-۱۰ روز بعد از تشخیص حاملگی
- ب) ۵۶-۱۷ روز بعد از تشخیص حاملگی
- ج) ۱۷-۱۰ روز بعد از تشخیص صدای قلب
- د) ۵۶-۱۷ روز بعد از لقاح



۱۵۵۵۷۸



۱۴۵- در نوزاد مبتلا به دیسترس تنفسی حاد در صورت طبیعی بودن ریه‌ها در رادیوگرافی قفسه سینه، کدامیک از موارد زیر بیشتر مطرح است؟

- (الف) کم‌خونی
  - (ب) فنق دیافراگم
  - (ج) سندرم دیسترس تنفسی
  - (د) هیپوپلازی ریه
- ۱۴۶- ساکشن مجاری تنفسی احتمال بروز کدام عارضه در نوزاد را افزایش می‌دهد؟
- (الف) پرتکولسیاسم
  - (ب) تاکی کاردی
  - (ج) اسپیراسیون
  - (د) منژیت

۱۴۷- ضربان قلب نوزاد ۵ دقیقه پس از تولد، ۷۰ ضربه در دقیقه - تنفس نامنظم و آهسته - رنگ پریده - با ورود کانتور به داخل سینی عطسه می‌کند و اندام‌ها دارای فلکسیون است. نمره آپگار دقیقه ۵ نوزاد چقدر است و اقدامات بعدی کدام است؟

- (الف) ۷ / تا یک ساعت هر ۵ دقیقه امتیاز اپگار اندازه‌گیری می‌شود.
- (ب) ۵ / تا ۲۰ دقیقه هر ۵ دقیقه امتیاز اپگار کنترل می‌شود.
- (ج) ۷ / نیاز به بی‌کسیری ندارد.
- (د) ۵ / احیای فوری نیاز است.

۱۴۸- همه گزینه‌ها برای تروخیس نوزاد ۳۷ هفته تا ۳۸ ساله و زایمان بدون عارضه صحیح است. به جز.....؟

- (الف) تنفس ۶۸ بار در دقیقه
- (ب) دفع یک بار مدفوع
- (ج) حداقل دو بار تغذیه مؤلفه‌آسیر بدون عارضه
- (د) درجه حرارت زیربغل ۳۶.۴-۳۶.۵ درجه سانتی‌گراد در چهارم بار

۱۴۹- وجود مناطق نرم در ناحیه پس سری نوزاد ممکن است با کدام عارضه همراه باشد؟

- (الف) اپلازی مادرزادی پوست سر
- (ب) پلاکیوستالی ناشی از تغییر شکل
- (ج) استوزترایسپروفکتا
- (د) تریزومی ۱۳

۱۵۰- در نوزاد متولد شده از مادر دیابتیک در خصوص سطح گلوکز خون، کدام اقدام صحیح است؟

- (الف) اگر بدون علامت باشد، نیاز به بررسی نیست.
- (ب) بلافاصله بعد از زایمان در همه نوزادان انجام می‌شود.
- (ج) در عرض ۳۰ دقیقه اول بعد از زایمان و قبل از تغذیه با شیر مادر باید انجام شود.
- (د) بعد از تغذیه از شیرمادر طی یک ساعت اول و دوم زندگی باید انجام شود.

### جنین‌شناسی

۱۵۱- الگوی افت متغیر ضربان قلب جنین در تست استروس انقباضی (CST) بیانگر کدام مورد زیر است؟

- (الف) اولیگوهدروآمیوس
- (ب) پلی‌هدروآمیوس
- (ج) طبیعی
- (د) ارزش تشخیص ندارد

۱۵۲- در ارتباط با منشأ بخش مادری جفت کدام گزینه صحیح است؟

- (الف) دسیدوای کبوسلی
- (ب) دسیدوای قاعدای
- (ج) کوریون صاف
- (د) کوریون فروندوزوم

۱۵۳- ترشح سورفاکتانت از کدام سلول‌ها و در چه زمانی شروع می‌شود؟

- (الف) پنوموسیت‌های نوع II از هفته ۲۷ جنینی به بعد
- (ب) پنوموسیت‌های نوع I از هفته ۲۶ جنینی به بعد
- (ج) پنوموسیت‌های نوع II از هفته ۱۸ جنینی به بعد
- (د) پنوموسیت‌های نوع II از هفته ۲۲ جنینی به بعد

۱۵۴- کدامیک از عوامل عفونی زیر موجب گلسی فیکاسیون مغزی در جنین می‌شود؟

- (الف) ویروس سرخچه
- (ب) توکسوپلاسموز
- (ج) ویروس HIV
- (د) واریسل‌زوستر

## «توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه  
به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

**اینجا کلیک نمایید**



# ایران استخدا

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

[Www.IranEstekhdam.Ir](http://www.IranEstekhdam.Ir)

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن  
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: [soal@iranestekhdam.ir](mailto:soal@iranestekhdam.ir)

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۱۱۳