




سوالات تخصصی آزمون استخدام

وزارت بهداشت ۱۴۰۲

(اتاق عمل)

(ارسالی کاربران)




سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

[Www.IranEstekhdam.Ir](http://www.IranEstekhdam.Ir)

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir 

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۰۱۳ 

[Www.IranStekhdam.Ir](http://www.IranStekhdam.Ir)

«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

اینجا کلیک نمایید

کاربردی دارد؟

- ب) جهت گره زدن نخ در داخل بدن بیمار است.
- ج) نوعی روش لیگاتور کردن عروق بزرگ است.
- د) می‌توان در جراحی‌های باز نیز از این تکنیک بهره برد.

۹۲- فشار هوای داخل اتاق عمل باید همواره نسبت به فشار هوای راهروی اتاق عمل به چه صورت است؟

- الف) منفی
- ب) مثبت
- ج) برابر
- د) صفر

۹۳- اصطلاح Turnover در اتاق عمل به چه معنا است؟

- الف) روشی کامپیوتری جهت انتخاب و انتقال ستهای جراحی
- ب) پکهای آماده قابل استریل شده که به‌طور استاندارد بسته‌بندی شده‌اند
- ج) پاکسازی اتاق عمل در انتهای جراحی و آماده شدن برای جراحی بعد
- د) الودگی‌زدایی و پاکسازی افلام قابل استفاده مجدد

۹۴- همه گزینه‌ها در مورد دستکش به‌عنوان یکی از وسایل محافظت شخصی در اتاق عمل صحیح است به جز:

- الف) همه دستکش‌های محافظ اشعه برای تماس مستقیم با پرتو مناسب هستند
- ب) دستکش‌های محافظ اشعه بدون سرب نیز وجود دارد
- ج) صابون‌ها و سورفاکتانت‌ها کاهش سطحی دستکش‌ها را کاهش و خطر نفوذپذیری آن را افزایش می‌دهند
- د) بعد از در آوردن دستکش‌ها دست‌ها شستشو داده می‌شود

۹۵- به‌منظور استفاده از اثر آنتی‌ویرال ایزوپروپیل الکل در ضد عفونی بیماری کووید-۱۹ کدام غلظت مناسب است؟

- الف) ۶۰-۸۰ درصد
- ب) ۷۰-۹۶ درصد
- ج) ۹۰-۹۶ درصد
- د) ۹۶ درصد

۹۶- کدام نواحی هنگام جراحی بازو پرپ می‌گردد؟

- الف) کل بازو تا مچ همراه با ناحیه آگزیلاری
- ب) دست و بازو به کامل
- ج) فقط بازو، شانه و ناحیه آگزیلاری
- د) کل بازو تا انگشتان دست و ناحیه آگزیلاری تا بالای شانه

۹۷- این ابزار دارای دندانهای خلاف جهت هم می‌باشد و برای بستن روده یا عروق بزرگ استفاده می‌شود؟

- الف) بیپاک
- ب) پنس اتروماتیک
- ج) هموستات
- د) کروشینگ کلمپ

۹۸- از کدام ماده زیر برای ضد عفونی کردن ابزار پلاستیکی و متخلخل نمی‌توان استفاده کرد؟

- الف) ترکیبات کلرین
- ب) گلو تارالدئید
- ج) ترکیبات فنولی
- د) فرمالدئید

۹۹- برای کنترل خونریزی اورژانسی کنترل نشده و زخم‌های حاصل از بیرون‌زدگی احشاء، از کدام روش استفاده

- الف) کاتولین
- ب) تانیک اسید
- ج) سوزن
- د) خمیر کلرید روی

۱-۲- امکان تهیه ظریف ترین سوچر جراحی (۱۱) از کدامیک از سوچرهای غیرقابل جذب زیر وجود دارد؟

(الف) نایلون

(ب) مرسلین

(ج) پلی استر

(د) پلی پروپیلن

۱-۳- کاف دستگاه تورلیکه هنگام بستن روی اندام حداقل چند سانتی متر باید روی هم قرار گیرد؟

(الف) ۵/۵ سانتی متر

(ب) ۷/۵ سانتی متر

(ج) ۱۰ سانتی متر

(د) ۱۲ سانتی متر

۱-۴- مناسب ترین درپ پلاستیکی چسب دار برای درپ چشم و گوش چیست؟

(الف) Incise Drap

(ب) Isolation Drap

(ج) Isolation Aperture Drap

(د) Aperture Drap

۱-۵- دمای مطلوب اتاق عمل نوزادان چند درجه سانتی گراد است؟

(الف) ۳۸-۳۹

(ب) ۳۰-۳۱

(ج) ۲۹/۴

(د) ۳۸/۴

تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی

۱-۶- میزان طبیعی زمان پارشیال ترومبوپلاستین PTT چقدر است؟

(الف) ۲۵ تا ۳۰ ثانیه

(ب) ۲۳ تا ۲۵ ثانیه

(ج) ۱۸ تا ۲۵ ثانیه

(د) ۲۳ تا ۴۰ ثانیه

۱-۷- در سندرم کمپارتمان چه فشاری الزام فاشیوتومی را مطرح می کند؟

(الف) فشار بیش از ۱۰ میلی متر جیوه

(ب) فشار بیش از ۴۰ میلی متر جیوه

(ج) فشار بیش از ۲۰ میلی متر جیوه

(د) فشار بیش از ۳۰ میلی متر جیوه

۱-۸- محل مناسب ورود گاز در جراحی های لاپاراسکوپی برای کودکان در کدام ناحیه است؟

(الف) محل مناسب ورود گاز برای کودکان ناحیه ای گاستر چپ یا هایپو کندریوم راست می باشد

(ب) محل مناسب ورود گاز برای کودکان قسمت تحتانی ناف در امتداد خط Lina Alba می باشد

(ج) محل مناسب ورود گاز برای کودکان ناحیه هایپو گاستر چپ یا هایپو کندریوم راست می باشد

(د) محل مناسب ورود گاز برای کودکان ناحیه ای گاستر چپ یا هایپو کندریوم چپ می باشد

۱-۹- در شرایط حضور بر بالین بیماری که در حضور تیم امدادی به صورت شاهد بدون پاسخ گشته و تنفس های مؤثر حرکت قفسه سینه ندارد. کدام اقدام اولویت دارد؟

(الف) فرستادن تکنسین دوم برای آوردن دستگاه AED از آمبولانس در صورت موجود بودن

(ب) معاینه مردمک از نظر پاسخدهی به نور

(ج) باز کردن راه هوایی و دادن تنفس

(د) فشرودن قفسه سینه

۱-۱۰- بوزیشن مریض و نوع دسترسی جراحی در آناستاموز شریانی مغز چگونه است؟

(الف) لترال کراتیوتومی سمپورال

(ب) سوپاین کراتیوتومی ساب اکسی پیتال

(ج) لترال کراتیوتومی اکسی پیتال

(د) سوپاین کراتیوتومی سمپورال

۱-۱۱- کدام گزینه در مورد اعمال جراحی دستگاه تناسلی زنان درست است؟

(الف) شایع ترین علت اوفورکتومی، تومورهای بدخیم تخمدان است

(ب) حساسیتهای خارج رحم در جراحی

۱۲۲- کدام گزینه در مورد راه هوایی بینی حلقی صحیح نیست؟

- الف) انتخاب اندازه مناسب برای هر فرد به منظور کاربرد مناسب الزامی است
- ب) کاربرد آن در بیمار با احتمال شکستگی قاعده جمجمه نسبت به راه هوایی دهانی حلقی ارجح است
- ج) استفاده از آن و در بیماری که رفلکس Gag دارد نسبت به راه هوایی دهانی حلقی ارجح است
- د) این وسیله موجب باز نگه داشتن راه هوایی می شود نه باز کردن آن

۱۲۳- در بیماری پارکینسون اختلال در کدام قسمت است و کدام میانجی کاهش می یابد؟

- الف) جسم سیاه، دوپامین
- ب) هسته تومبار، استیل کولین
- ج) هسته زیر تالاموسی، گلوتامات
- د) گلوبوس پالیدوس، گلیسین

۱۲۴- کدام مورد جزء موارد منع مصرف نیتروگلیسرین نمی باشد؟

- الف) بیماری که دچار ترومای سر شده است
- ب) مصرف ویاگرا در ۲۴ ساعت گذشته
- ج) فشار خون سیستولیک زیر ۰/۴ میلی متر جیوه
- د) وجود خس خس سینه و دیسترس تنفسی شدید

۱۲۵- کدام گزینه معادل گلودرد است؟

- الف) فارنژیت
- ب) لارنژیت
- ج) گلویت
- د) منشاء اصلی سیستم ریکولو اندوتلیال شامل کدام گزینه های زیر می باشد؟

۱۲۶- منشأ اصلی سیستم ریکولو اندوتلیال شامل کدام گزینه های زیر می باشد؟

- الف) لنفوسیتها
- ب) مونوسیتها
- ج) گرانولوسیتها
- د) پلاسماسلها

۱۲۷- کدامیک از آزمون های شنوایی زیر برای تمایز کاهش شنوایی انتقالی از کاهش شنوایی حسی - عصبی مفید است؟

- الف) ریته
- ب) وبر
- ج) شنوایی سنجی
- د) نتجوا انتقال

۱۲۸- مرفین از داروهای مخدر ضد درد است که استفاده گسترده ای در بیمارستان دارد. مدت اثر این دارو در صورت تزریق چقدر است؟

- الف) ۲ تا ۳ ساعت
- ب) ۳ تا ۴ ساعت
- ج) ۴ تا ۵ ساعت
- د) ۵ تا ۶ ساعت

۱۲۹- شایع ترین تومور خوش خیم استخوانی کدام گزینه است؟

- الف) استئوکلاستوما
- ب) کندروسارکوما
- ج) استئوکندروما
- د) رادومیوما

۱۳۰- کدامیک از موارد زیر جزء نشانه های سوختگی درجه سوم نیست؟

- الف) همولیز
- ب) هماجوری
- ج) علام شوک
- د) درد شدید

۱۳۱- کدامیک از موارد زیر از علائم پتوموتوراکس است؟

- الف) افزایش صدای تنفسی در سمع ریه
- ب) وجود رال در قفسه سینه
- ج) همونانژی
- د) تاکی پنه

۱۳۲- سندرم شوگرن موجب بروز کدام مورد می شود؟

- الف) زخم دهان
- ب) زروستومی
- ج) آرترالژی
- د) پریکاردیت

۱۳۳- علامت مثبت Whiff مشخصه کدام عفونت واژینال است؟

- الف) باکتریایی
- ب) کاندیدیایی
- ج) تریکومونایی
- د) پاییلومیایی

۱۳۴- جهت تعیین اندازه، شکل و حرکت ساختمان های قلبی کدام آزمون تشخیصی مناسب تر است؟

- الف) الکتروکاردیوگرام
- ب) سی تی اسکن
- ج) آنژیوگرافی
- د) اکوکاردیوگرافی

(ج) اعمال شوک الکتریکی سریع
(د) CPR فوری با کیفیت بالا

۱۳۷- در فالتز دهلیزی مقدار انرژی برای شوک اول چقدر است؟

- (الف) ۱۲۰-۲۰۰ بای فازیک
- (ج) ۲۵۰-۳۰۰ بای فازیک
- (ب) ۲۰۰-۳۰۰ مونوفازیک
- (د) ۲۰۰ مونوفازیک

۱۳۸- بیمار آقای ۶۰ ساله به علت تصادف در بزرگراه با خونریزی از گوش و بینی بلافاصله در بخش اورژانس بستری شد. است کدام اقدام در اولویت قرار دارد؟

- (الف) آماده نمودن بیمار برای MRI
- (ج) کنترل جذب و دفع بیمار
- (ب) ناشتا نگه داشتن بیمار
- (د) کنترل سطح هوشیاری و علائم حیاتی

۱۳۹- حداکثر سرعت فشردن قفسه سینه در اقدامات احیا چند بار در دقیقه است؟

- (الف) ۶۰
- (ب) ۹۰
- (ج) ۱۰۰
- (د) ۱۲۰

۱۴۰- تعداد تهویه در دقیقه برای یک بزرگسال در شرایط احیای قلبی ریوی پایه، وجود لوله تراشه پس از بازگشت نبض مرکزی به ترتیب عبارت است از:

- (الف) ۱۲، ۱۰، ۱۰
- (ب) ۱۲، ۱۲، ۱۲
- (ج) ۸، ۸، ۸
- (د) ۱۰، ۸، ۵

۱۴۱- در لوله گذاری نای لوله بیشتر در کدام برونش وارد می شود؟

- (الف) برونش راست
- (ب) برونش چپ
- (ج) هر دو
- (د) کارینا

۱۴۲- به ازای هر اتاق عمل چند تخت ریکاوری لازم است؟

- (الف) ۲ تخت
- (ب) ۵ تخت
- (ج) ۱ تخت
- (د) ۴ تخت

۱۴۳- کدام پیامد در کاربرد تیوپنتون بیشتر دیده می شود؟

- (الف) کاهش نبض
- (ج) کبودی
- (ب) کاهش فشار خون
- (د) تشنج

۱۴۴- واپورایزر در ساختمان دستگاه بیهوشی چه نقشی دارد؟

- (الف) کاهش فشار
- (ج) تبخیر کننده داروهای استنشاقی بیهوشی
- (ب) آزاد کردن، تبخیر و اندازه گیری گازها
- (د) رساندن گازها و داروها به بیمار

۱۴۵- عامل اصلی ایست قلبی در کودکان کدام مورد است؟

- (الف) اختلال تنفسی
- (ج) تاکی کاردیای بطنی
- (ب) فیبریلاسیون بطنی
- (د) فیبریلاسیون دهلیزی

- در پروتکل احیاء زمانی که افراد احیاگر دو نفر می باشند، نسبت ماساژ قلبی به تنفس در اطفال چه میزان است؟

- (الف) ۱۵ به ۱
- (ب) ۳۰ به ۲
- (ج) ۳۰ به ۱
- (د) ۱۵ به ۲

در گرید ۳ لارنگوسکوپی کدام نواحی قابل مشاهده است؟

- (الف) نمای کامل ورودی گلو
- (ب) بخش خلفی ورود لوله و طناب های صوتی
- (ج) کام نرم
- (د) کام نرم

نوک اپی گلو

۱۴۰۲/۲/۱۳

۱۴۹- دوز نیوتال به عنوان خواب آور در اینداکشن چقدر است؟

- (الف) ۱ تا ۲ میلی گرم بر کیلوگرم
- (ب) ۲ تا ۳ میلی گرم بر کیلوگرم
- (ج) ۲/۵ تا ۳ میلی گرم بر کیلوگرم
- (د) ۵/۵ تا ۷/۵ میلی گرم بر کیلوگرم

۱۵۰- کدامیک از داروهای زیر به ترتیب جزء دسته طولانی الاثر و متوسط الاثر داروهای شل کننده عضلانی می باشد؟

- (الف) گالامین امیواکوریوم
- (ب) پانکرونیوم ارکوریوم
- (ج) انراکوریوم ارکوریوم
- (د) رگورونیوم ادی توبوکورارین

مدیریت در اتاق عمل (قبل، حین عمل و بعد از عمل)

۱۵۱- در ارتباط با استریل کردن ابزار و محل قرارگیری آن ها جهت استریلیزاسیون کدام عبارت صحیح نمی باشد؟

- (الف) کسه های محتوی ابزار و وسایل استریل شونده نباید روی سطح سینی یا دیش خوابانده شوند
- (ب) کسه های نایلونی و پلاستیکی می تواند مانع نفوذ بخار به داخل کیسه شود
- (ج) فرصت کافی جهت سرد شدن دستها قبل از جابه جایی داده شود
- (د) ابزار استریل موجود در میسک باید در داخل میسک باز شوند

۱۵۲- کدام گزینه مراحل قبل از عمل را به ترتیب درست نشان می دهد؟

- (الف) بستن کاف تورنیکه، باد کردن تورنیکه، برپ اولیه، برپ ثانویه
- (ب) برپ اولیه، بستن کاف تورنیکه، برپ ثانویه، باد کردن تورنیکه
- (ج) برپ اولیه، برپ ثانویه، بستن کاف تورنیکه، باد کردن تورنیکه
- (د) بستن کاف تورنیکه، برپ اولیه، برپ ثانویه، باد کردن تورنیکه

۱۵۳- همه موارد زیر در مورد آمادگی قبل از اسکراب کردن دستها صحیح است به جز

- (الف) لاک ناخن نباید دچار بریدگی یا ترک خوردگی باشد
- (ب) تمامی زیور آلات از انگشتان میج و گردن خارج شود
- (ج) جهت حفاظت پوست بهتر است از لوسیون روغنی استفاده شود
- (د) ناخن نباید روی نوک انگشتان بیاید

۱۵۴- اگر حین عمل یکی از ابزارهای جراحی به روی زمین افتاده شود و فرد سیار بلافاصله اطمینان حاصل کند که تیم جراحی به آن نیاز ندارند؛ بهترین اقدامی که در مرحله بعد توسط فرد سیار می تواند انجام بگیرد، چیست؟

- (الف) با اثر مخصوص ابزار را برداشته و داخل یک ظرف مخصوص بیاندازد.
- (ب) با اثر مخصوص ابزار را برداشته و داخل یک ظرف مخصوص بیاندازد و بلافاصله به اتاق شستشو تحویل دهد.
- (ج) با اثر مخصوص ابزار را برداشته و داخل یک ظرف مخصوص محتوی آب یا ماده ضد عفونی بیاندازد.
- (د) با دست مجهز به دستکش ابزار را برداشته و داخل یک ظرف مخصوص بیاندازد و بلافاصله به اتاق شستشو تحویل دهد.

۱۵۵- کدامیک از گزینه های زیر از عوارض جراحی بعد از برداشت کیسه صفرا نیست؟

- (الف) آسیت
- (ب) امبولی
- (ج) ترومبوفلیت
- (د) پریتونیت

۱۵۶- در جراحی برداشت طحال جهت حفظ عملکرد طحال کدام مورد انجام نمی شود؟

- (الف) بعد از برداشت بخشی از طحال (اسپلنکتومی پارشیال) لبه باقی مانده را می توان با بخیه یا استاپلر دوخت
- (ب) در ترومای طحال کلارن میکروفیبریلار یا اسپانچ های ژلاتین قابل جذب را می توان جهت هموستاز اسپه های خیلی بزرگ قرار داد
- (ج) ممکن است از امنوم یا مش سنتتیک جهت پوشاندن طحال استفاده شود
- (د) جهت حفظ عملکرد طحال می توان طحال را درون یک کیسه امنوم در فضای داخل صفاقی قرار داد

۱۵۷- عمل جراحی در بیمارانی که از مواد رادیواکتیو استفاده می کنند تا چند ساعت بعد از آزمایش باید به تأخیر انداخته شود؟

- (الف) ۲۴ ساعت
- (ب) ۳۶ ساعت
- (ج) ۴۸ ساعت
- (د) ۷۲ ساعت

«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

اینجا کلیک نمایید



ایران استخدا

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

[Www.IranEstekhdam.Ir](http://www.IranEstekhdam.Ir)

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۱۱۳