




سوالات تخصصی آزمون استخدام

وزارت بهداشت ۱۴۰۲

(فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی (کارдан))

(ارسالی کاربران)



سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

soal@iranestekhdam.ir



شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۰۱۳



Www.IranStekhdam.Ir

«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

اینجا کلیک نمایید

اورزانشای ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آن

- ۱۰۶- ارزیابی مرحله Disability بیمار ترومایی شامل چه مواردی است؟**
- (ب) GCS، مردمکها، بررسی حس و حرکت کلی اندامها
 - (الف) بوزشن راه هوایی، مردمکها
 - (ج) GCS برقراری راه هوایی، کنترل خونریزی
 - (د) مردمکها، آتل بندی
- ۱۰۷- براساس پروتکل های آفلاین در مدیریت بیمار ترومایی پس از ارزیابی صحنه در Primary survey اولین اقدام کدام است؟**
- (الف) بی حركت سازی ستون فقرات گردانی، کنترل خونریزی خارجی، انتقال به آمبولانس
 - (ب) مدیریت راه هوایی، مدیریت ستون فقرات گردانی، کنترل خونریزی خارجی
 - (ج) مدیریت راه هوایی و بررسی تنفس
 - (د) انتوپاسیون بیمار، بستن تورنیک
- ۱۰۸- در یک درگیری گروهی، فردی دچار اصابت گلوله به شکم شده است و روی زمین افتاده است. کدام اقدام به عنوان تکنسین اورزانش در اولویت است؟**
- (ب) تماس با پلیس
 - (ج) روش کردن از برآمده اصل اصول ایمنی صحنه
 - (د) استفاده از بلندگوی آمبولانس برای آرام کردن صحنه
- ۱۰۹- در مواجهه با بیرون زدگی ارگان های شکمی در اورزانش بیش بیمارستانی بهترین اقدام کدام است؟**
- (الف) قربودن ارگان های بیرون زده به درون حفره شکمی
 - (ب) قرار دادن احتشام درون بیوشن استریل مرتقب در بانداز
 - (ج) جلوگیری از خونریزی با بانداز محکم احتشام
 - (د) قرار دادن کیسه یخ روی احتشام
- ۱۱۰- همکار تکنسین از شما خواسته است که یک پانسمان را روی زخم مکنده قفسه سینه قرار دهید. بهترین گزینه برای پانسمان این آسیب کدام گزینه است؟**
- (الف) استفاده از پانسمان گاز استریل (سه طرفه)
 - (ب) استفاده از گاز واژلیته (سه طرفه)
 - (ج) استفاده از گاز واژلیته (سه طرفه)
- ۱۱۱- در یک حادثه ترافیکی به صحنه رسیده اید. تصادف در وسط اتوبان بین شهری است و پلیس پس از صحنه متوقف شده است. مناسب ترین اقدام کدام است؟**
- (الف) پس از صحنه متوقف شده و علامت هشدار را ۲۰ متر قبل از صحنه قرار می دهیم
 - (ب) ۵ متر قبل از صحنه متوقف شده و بلاعاقله اقدامات درمانی را شروع می کنیم
 - (ج) پس از صحنه متوقف شده، از پلیس می خواهیم اینستیت صحنه را برقرار نموده و سپس اقدامات درمانی را شروع می کنیم
 - (د) منتظر حضور انتش نشانی شده و سپس وارد صحنه می شویم
- ۱۱۲- بیماری بر اثر تصادف با موتورسیکلت دچار دفور میتی ران چپ و خونریزی بسیار شدید از محل زخم است. علایم حیاتی GCS:13/15 BP:90/P PR:110 SPO₂:96% کدام اقدام اولویت دارد؟**
- (الف) بررسی وضعیت تنفس
 - (ب) گذاشتن بیمار روی یک بورده
 - (ج) تزریق نرمال سالین وریدی
 - (د) کنترل خونریزی با فشار مستقیم
- ۱۱۳- فشارخون مناسب در مدیریت بیمار ترومایی دچار افت فشار خون و با آسیب شدید سو کدام است؟**
- (الف) ۹۰-۸۰
 - (ب) ۱۱۰-۱۰۰
 - (ج) ۱۲۰-۱۱۰
 - (د) ۱۰۰-۹۰
- ۱۱۴- موتورسواری پس از برخورد به یک خودروی سواری، پرتاب شده و از ناحیه کمر به جدول برخورد گرده است. در معاینه پای چپ ضعف شدید حرکتی دارد و حس حرارت در پای راست وجود ندارد. کدام سندروم آسیب نخاعی محتمل تر است؟**
- (الف) سندروم نخاع قدامی
 - (ب) سندروم شوک نخاعی
 - (ج) سندروم براون سکوارد
 - (د) سندروم دم اسی
- ۱۱۵- اقدام درمانی مناسب در بیمار با تشخیص Flail chest به دنبال آسیب به قفسه سینه کدام است؟**
- (الف) خواباندن بیمار روی سمت مبتلا
 - (ب) بستن قفسه سینه بیمار با کمربند
 - (ج) استفاده از ضد درد و دادن اکسیژن با قلوی بالا
 - (د) استفاده از کیسه شن روی سمت مبتلا
- ۱۱۶- راکب موتورسیکلت بر اثر تصادف با خودرو از روی دچار واگنونی و ترومایی شده است. در معاینات مصدوم بیان می گند دچار درد در لگن است. اولین اقدام شما در معاینه لگن کدام است؟**
- (الف) فشار به سمت خارج کرست ایلیاک
 - (ب) فشار به سمت داخل کرست ایلیاک
 - (ج) نیاز به معاینه لگن نیست. بدون معاینه ثابت سازی می کنیم
 - (د) فشار به سمت مخفیز بوسیل

۱۱۷- بیماری دچار نروما شده است. در صحنه دهان بیمار و اصحاب بیوی الکل می‌دهد و شروع به تشنج هی‌کند کدام اقدام در اولویت است؟

- (الف) چک قند، خون بیمار
- (ج) مانیتورینگ قلبی و اکسیژن
- (ب) تزریق میدازولام
- (د) انتقال بیمار در حالت خوابیده به بیهو

۱۱۸- آفای جوانی حین کار با دستگاه برش در کارگاه دچار آمپوتاسیون از بالای مچ دست شده است خونریزی شریانی شدید دارد کدام گزینه حین انتقال نادرست است؟


- (الف) مستسوی عضو قطع شده با فشار با نرمال سالین
- (ب) تورنیک اندام
- (د) عضو له شده باید همراه بیمار منتقل شود
- (پ) بانسان فشاری محل رخم

۱۱۹- عابر پیاده ای به دنبال حادثه ترافیکی روی زمین افتاده است. در بدوعایته متوجه آسیب به ناحیه سر می‌شود. قبل از رسیدن شما تکنسین موتور آمبولانس از بیمار رگ گرفته است. قبل از شروع ارزیابی اولیه، بیمار دچار تشنج تونیک گلونیک می‌شود. بهترین اقدام در زمان تشنج فعال بیمار کدام است؟

- (الف) کنترل تشنج با استفاده از بنتزودیازین
- (ب) آنتوباسیون بیمار
- (ج) تزریق فلزی تونین وریدی
- (د) کنترل فشار خون بیمار

۱۲۰- شکل مقابل نشان دهنده کدام نوع خونریزی مغزی متعاقب تروماست؟

- (الف) ساب دورال
- (ب) SAH
- (ج) ابی دورال
- (د) ICH



اورژانس‌های داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آن

۱۲۱- کدامیک از انواع شوک در بیمار دچار آمبوی ریه شایع‌تر است؟

- (الف) شوک نروزنیک
- (ب) شوک اتسدادی
- (ج) شوک توزیعی
- (د) شوک هموزاییک

۱۲۲- کدام دارو برای بیمار دچار سمومیت با متابول مناسب نیست؟

- (الف) فومیزول
- (ب) اتانول وریدی
- (ج) اتانول خوراکی

۱۲۳- همکار شما با سابقه مصرف داروی ضد تشنج دارد و به طور ناگهانی تشنج تونیک گلونیک می‌کند. اولین اقدام شما کدام گزینه است؟

- (الف) تزریق میدازولام
- (ج) چک نیض کاروتید

۱۲۴- بیمار آفای ۵۸ ساله با سابقه آسم، دچار تنگی نفس شده است. تنگی نفس وی ناگهانی و فعالیتی بوده است. در

معاینه هوشیار ولی مضطرب است. سمع ریه رال دارد. BP:105/80 RR:106 در شکل را در شکل می‌بینید)

- (الف) سالبوتانول
- (ب) آتروبوت
- (ج) هیدروکورتیزون
- (د) لازیک



۱۲۵- کودکی با وزن حدود ۲۰ کیلوگرم دچار اختلال سطح هوشیاری و تعریق و رنگ پریدگی است و اخنال در بیان دارد در چک قند، عدد ۳۸ را روی دستگاه گلوكومتر می‌بینید. کدامیک از درمان‌های زیر را برای بیمار انجام می‌دهد؟

- (الف) ۵ سی سی از محلول دکستروز ۲۰ درصد
- (ج) ۲۵ سی سی از محلول دکستروز ۵۰ درصد
- (ب) ۲۵ بی سی از محلول دکستروز ۵۰ درصد
- (د) ۵۰ بی سی از محلول دکستروز ۵۰ درصد

۱۲۶- پسر ۱۷ ساله روزتایی با کاهش سطح هوشیاری را ویزیت می‌کند. در گلوكومتری High BS می‌باشد با توجه به اینکه تا مرگ درمانی یک ساعت فاصله دارد، اقدام مناسب در صحنه کدام گزینه است؟ بیمار انسولین در منزل دارد

- (الف) تزریق NS

NPH

- (ب) تزریق انسولین
- (ج) تزریق ناوتکال

۱۲۷- پنج شنبه شب والدین کودک ۷ ساله ای با ۱۱۵ تماس گرفته‌اند. طبق گزارش ایشان کودک دچار یک حمله تشنج شده است. شما بر بالین وی حاضر می‌شوید در معاینه کودک تپ دار و دچار افت هوشیاری است. معاینه نرولوژیک وی نشان دهنده سفتی و ردور گردن است. روی پوست خمایعاتی مشاهده می‌شود. شما مجبور به مدیریت راه هوایی وی شده اید و بدلیل اختطراب والدین فراموش کردید که ماسک بزنید. کدام گزینه در این ماموریت درست است؟

(الف) سیبروفلوکسائین خوارکی می‌خورید.

(ب) سفتریاکسون CSF بیمار می‌شود، اگر مشتبه بود سفتریاکسون به خودتان تزریق می‌کنید.

(ج) آموکسی سیلین شروع می‌کنید.

(د) تا شنبه صبر می‌کنید و برای مشاوره به کلینیک عفونی می‌روید.

۱۲۸- بر بالین بیماری حاضر می‌شود که در مقابل شما دچار علایم تشنج می‌شود. متعاقب اجرای بروتکل جامع بروخورد با بیمار تروماستی، و به محض دیدن تشنج در بیمار اولین اقدام نیض را چک می‌کنید. بیمار نیض ندارد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

(الف) در جریان تشنج، نیض معمولاً نیض لمس نمی‌شود

(ب) VF

(ج) آسیتو

(د) PEA

۱۲۹- بیماری با سابقه آسم دچار آسم شده و علیرغم مصرف اسپری خوب نشده و با EMS تماس گرفته است. در حال حاضر بیمار کاملاً سپیانوتیک است. دیسترس تنفسی دارد. BP:100/30 PR:140 است و سمع دو طرفه صدایی شنیده نمی‌شود. بیمار کاملاً بی قرار است اقدام مناسب در این مرحله کدام گزینه است؟

(الف) هیدروکورتیزون وریدی (ب) آین تفرین عضلانی (ج) میدازولام وریدی (د) آمیتوفیلین وریدی

۱۳۰- تندرنس در نقطه مک بورنی به نفع کدام تشخیص است؟

(الف) آپاندیست

(ب) کوله سیستیت

(ج) ایسکمی شریان مزانتریک

(د) برقوراسیون معده

۱۳۱- مسمومیت بیماری دو ساعت قبل دوز بالای آمی تربتلین مصرف کرده و با ۱۱۵ تماس گرفته است. در بالین مختصری طیش قلب دارد و در نوار قلب فقط ناکی کارهای سینوسی دارد. اقدام مناسب کدام است؟

(الف) توصیه به استفراغ (ب) تجویز برابرائل و توصیه مراجعته سریاپی

(ج) تزریق بی کربنات وریدی (د) اعزام به بیمارستان و انجام مانیتورینگ دقیق قلبی

۱۳۲- خانم ۳۵ ساله بعلت تیش قلب مراجعته نموده است. بیمار تنگی نفس یا درد قفسه سینه و احساس سینکی سر ندارد. فشار خون بیمار ۱۲۰/۷۸ می‌باشد. کدام اقدام اول توصیه می‌شود؟

(الف) آدنوزین ۲ میلی گرم IV Bolus

(ب) آدنوزین ۱۲ میلی گرم slow push IV (اطی ۱ تا ۲ دقیقه)

(ج) آین تفرین ۱ میلی گرم IM و تکرار در صورت لزوم

(د) مانور تحریک سمباتیک

۱۳۳- در بیماری که علامت FAST مشتبه است کدام اقدامات در صحنه انجام می‌شود؟

(الف) پایش فشار خون - برقراری خط وریدی - سکنترل قند خون

(ب) فعال کردن کد سما - پایش فشار خون - برقراری خط وریدی - سکنترل قند خون

(ج) فعال کردن کد سما - پایش فشار خون - برقراری خط وریدی - سکنترل قند خون - شرح حال

(د) پایش فشار خون - برقراری خط وریدی - سکنترل قند خون - شرح حال

۱۳۴- آقای میانسال با سابقه مشکل ریوی دچار تپ و ناکی کارهای و شعف شده است. واحدا دیسترس تنفسی دارد و در سمع وریدها ویزینگ و کراکل بینزالیزه سمع می‌شود. کدام یک از درمانهای زیر در اولویت نمی‌باشد؟

(الف) اسپری سالیوناتول

(ب) هیدروکورتیزون وریدی (ج) سفتریاکسون تزریقی

(د) اسپرس آتروونت

۱۳۵- کودک ۷ ساله ای در هتل دچار تهوع و استفراغ و اسهال شده است. اسهال بیمار غیر خونی ولی حجم است. بدلیلی شخصی تعایل به اعزام به بیمارستان ندارد. از بین داروهای زیر کدام گزینه مناسب وی نیست؟

(الف) سرم نرمال سالین

(ب) متوكولورامید (ج) هیوپسین

(د) انداشترون

عوارد ویزه (اطفال، سالمندان، زنان و اورزانس محیطی)

۱۳۶- پیش‌بین اقدام مناسب برای بیمار دچار هایپرتریم کدام است؟

ب) اسپری آب ۴۵ درجه و استفاده از فن

(الف) اسپری آب ۱۵ درجه و استفاده از فن

د) قوارداش کمی بخ در دست و یا و سورت بیمار

ج) اسپری آب سرد و استفاده از فن

۱۳۷- خاتمه ۲۲ ساله باردار در هفته ۳۱ بارداری دچار سودرد شدید و درد اپنگاستر شده است. حین اطفال به بیمارستان

دچار نشیغ توئیک کلوتیک می‌شود. موثر ترین درمان برای بیشگیری از تشنج‌های بعدی در این بیمار کدام است؟

د) سولفات منیزیم

ج) فنی توئین

(الف) دیازم

۱۳۸- کودک ۵ ساله ای متعاقل گوش زنبور دچار تورم صورت و لبها، تنفس نفس، تهوع، درد شکم و دیسترس تنفسی

ب) این ترین ۵۰ میلی گرم عضلانی

شده است. اقدام مناسب کدام گزینه است؟

د) درمان‌های حمایتی

(الف) این ترین ۲۰ میلی گرم عضلانی

ج) هیدروکورتیزون ۰.۱٪

۱۳۹- حادثه به دنیال زایمان، یک ساعت قبل دچار تداوم خونریزی واژنال شده است. با توجه به فاصله حدود یک ساعت تا عرض درمانی کدام اقدام زیر درست نصیباًشد؟

ب) چک وزن با گاز استریل

(الف) چک و جزوی تطبیقی جفتی در رحم

د) اندامی لازم ندارد

ج) تزریق نرم‌مال سالم

۱۴۰- در کنتراک دیگار دچار اختلال رفتاری و دوامی در صورت نیاز به ایجاد مهار فیزیکی کدام گزینه صحیح نیست؟

ب) ایجاد محدودیت فیزیکی فقط با استفاده از دست و یا

د) قرار دادن بیمار در وضعیت Prone

ج) استفاده از مهار کننده عریق و جوش

۱۴۱- بدنیال تحسیں که بالکرد به منطقه کوهستانی اعزام شده است. آفای ۲۷ ساله ای را ویزیت می‌کنید که بدنیال

گزینش صحیح دست با نیش هزار با ۱۱۵ تراس گرفته است. هار را کشته‌اند و شکل آن را مشاهده می‌کنند. همراهان بالای آرنج

وی را محکم با چاند پسته‌اند. به نحوی که جریان خون قطع شده است. شمانیم ساعت تا مرگ درمانی فاصله دارد. بیمار



Lithotomy.

۱۴۲- در زایمان اگر عضو نهایش سر نوزاد نباشد مادر در چه یوزیستی باید قرار گیرد؟

Squatting.

Prone.

۱۴۳- نوزاد ۷۲ روزه‌ای نیازمند تهییه با ماسک است. وزن وی ۳ کیلوگرم است. در مورد تعداد تنفس و حجم نسبی در هر

تنفس کدام گزینه مناسب‌تر است؟

(الف) ۰٪ در دقیقه - ۲۰ سی سی

ج) ۱٪ در دقیقه - ۲۰ سی سی

ب) ۲۰ تا در دقیقه - ۲۰ سی سی

د) ۳۰ تا در دقیقه - ۱۲ سی سی

۱۴۴- بیمار ۴۰ ساله در صرک تکه‌داری سالمندان دچار درد شدید و ناگهانی کمر با انتشار به زان سمت چپ شده

است. بیمار سبله صرف دار و های متعدد به دلیل فشار خون بالا و مبتکل قلبی ریوی و آرزاییدار. جراحی تنگی کانال

نهایی هم ۱۰ سال قبل انجام داده است. اقدام مناسب کدام است؟

(الف) جذب انسدادی دستی

ج) جذب انسدادی دستی

ب) تزریق باتمانیون عضلانی

د) نیازمند کاربیستری نمی‌باشد

۱۴۵- در بیو دنی چرک سازی بیماری که دچار مارگزیدگی شده کدام گزینه صحیح است؟

ج) این حرکت سازی کنل بیمار و ندو گزیده شده لازم است

ب) این حرکت سازی بیمار لازم نیست

۱۴۶- در خونریزی واژنال در صورت وجود علامت شوک انجام کدامیک از گزینه‌ها صحیح نیست؟

ج) این بیانات ممکن است از ۰-۱ لیتر

ب) مبتکل فرمودوس در خونریزی بعد از زایمان

د) قرار دادن بیمار در زیر نرم‌مال سالم

«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

اینجا کلیک نمایید



ایران استکدام

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۱۱۳ | آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir

Www.IranEstekhdam.Ir