




سوالات تخصصی آزمون استخدام

وزارت بهداشت ۱۴۰۲

(مامایی)

(ارسالی کاربران)



سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir 

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۰۱۳ 

«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

اینجا کلیک نمایید

بارداری و زایمان ۱ و ۲

- ۹۱- خون ریزی قاعدگی در چه مرحله‌ای از سیکل تخمک‌گذاری رخ می‌دهد؟
 (الف) هفته دوم سیکل تکثیری
 (ب) هفته اول سیکل تکثیری
 (ج) هفته اول سیکل تکثیری
 (د) هفته دوم سیکل تکثیری
- ۹۲- در معاینه واژینال خانمی G3P2 در لیبر فاصله بین اربت‌ها و فونتانلی قدیمی به دست می‌خورد. تشخیص چه نوع پرزانتاسیونی است؟

- (الف) مرکب
 (ب) پیشانی
 (ج) صورت
 (د) ورتکس

- ۹۳- درباره فیزیولوژی سیکل تخمدانی عبارت غلط کدام است؟
 (الف) در اواخر دوره فولیکولی LH تولید اندروژن‌ها توسط سلول‌های تکا را تحریک می‌کند.
 (ب) LH موجب افزایش گیرنده‌های خود و تبدیل اندروژن‌ها به استروئید می‌شود.
 (ج) با رشد فولیکول‌های آنترال سلول‌های استرومای اسیطه‌کننده آنها به سلول‌های تکا تبدیل می‌شوند.
 (د) اوج ترشح استروژن حدود ۲۶ ساعت و اوج ترشح LH حدود ۱۲ ساعت قبل از تخمک‌گذاری است.
- ۹۴- در کدامیک از موارد زیر تولید استروژن جفتی افزایش می‌یابد؟

- (الف) ترمومی ۲۱
 (ب) آرمیوپلاستوز جنینی
 (ج) کمبود آروماتاز جفتی
 (د) بیماری تروفوبلاستیک

- ۹۵- تحرک زود هنگام پس از زایمان از چه مزیتی برخوردار است؟
 (الف) کاهش بیوسنتز
 (ب) ترمیم سریع تروبی زیاتومی
 (ج) افزایش ترشح شیر از پستان
 (د) کاهش طول مدت دفع لوتیسا

- ۹۶- کمست‌های تکا - لوتیشی در کدام بارداری مشاهده نمی‌شود؟
 (الف) مول
 (ب) ایزوایمونیزاسیون D
 (ج) دیابت
 (د) هیپوتیروئیدی

- ۹۷- درد مادر باردار طی مراحل مختلف زایمان منجر به کدام اختلال متابولیکی زیر می‌شود؟
 (الف) اسیدوز متابولیک
 (ب) آلکالوز متابولیک
 (ج) اسیدوز تنفسی
 (د) اختلال مخلوط اسید - باز

- ۹۸- در کدامیک از موارد زیر تکیکاردی قلبی جنین مشاهده می‌شود؟
 (الف) بلوک مادرزادی قلب جنین
 (ب) هیپوترمی مادر
 (ج) پیلونفریت شدید مادر
 (د) تزریق آتروپین به مادر

- ۹۹- خانمی در طی بارداری دچار اورتریت و عفونت غده بارتولین بوده است. پس از زایمان که ۲۷ هفته انجام شده، نوزادش مبتلا به عفونت چشمی شده است. تشخیص شما چیست و این خانم در بارداری باید چه درمانی دریافت می‌کرد؟
 (الف) کلایدیا / اریترومايسين
 (ب) گنوره / سفتریاکسون
 (ج) لنفوگراتولوم و تروم / آریترومايسين
 (د) شاکروئید / آریترومايسين

- ۱۰۰- نمای میکروسکوپی موكوس سرویکس در بارداری چگونه و در اثر کدام هورمون است؟
 (الف) سرخی، پروژسترون
 (ب) سرخی، استروژن
 (ج) دانه تسیخی، پروژسترون
 (د) دانه تسیخی، استروژن

بارداری و زایمان ۳ و ۴

- ۱۰۱- کدامیک از اقدامات زیر در موقعیت ابتدای به آمبولی مایع آمیون صحیح می‌باشد؟

- (الف) انجام احیاء قلبی - ریوی
 (ب) حفظ درجه حرارت در سطح ۳۸ درجه سانتی‌گراد
 (ج) حفظ میانگین فشار شریانی در سطح ۹۵ میلی‌متر جیوه
 (د) تجویز مایعات برای اتساع پطن راست

- ۱۰۲- چنانچه شروع علائم بالینی آبله مرغان (varicella) در مادر باردار ۴ روز قبل از زایمان یا ۲ روز پس از آن باشد، اقدام ضروری چیست؟
 (الف) ایمونوگلوبولین زوستر به نوزاد تزریق شود
 (ج) ایمونوگلوبولین زوستر به مادر باردار تزریق شود
 ۱۰۳- محل تزریق واکسن ب.ث.ژ کدام است؟
 (الف) زیرجلد / بازو
 (ب) درون پوست / ساعد
 (ج) داخل عضله / بازو
 (د) داخل جلد / بازو
 ۱۰۴- برای اداره پارگی پیش از موعد و پره‌توم پرده‌ها، در کدامیک از سنن حاملگی زیر پروفیلاکسی استرپتوکوک گروه B توصیه نمی‌شود؟
 (الف) کمتر از ۲۴ هفته
 (ج) ۲۲ هفته تا ۳۳ هفته کامل
 (ب) ۲۴ هفته تا ۳۱ هفته کامل
 (د) ۳۴ هفته و بیشتر
 ۱۰۵- در دایلم رنگی خانم باردار نمای «حلقه آتش» دیده می‌شود. کدامیک از تشخیص‌های زیر محتمل است؟
 (الف) سقط خودبخود
 (ج) مول‌هیداتفرم
 (ب) حاملگی اکوتوپیک
 (د) سقط ناقص
 ۱۰۶- کدامیک از موارد زیر از کنترااندیکاسیون‌های مصرف گنادوتروپین در درمان ناباروری است؟
 (الف) لقای تخمک‌گذاری در افراد مبتلا به هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک
 (ب) سوپراوولاسیون در همراهی با IUI
 (ج) نارسایی اولیه تخمدان با میزان بالای FSH
 (د) لقای تخمک‌گذاری در PCOS همراه با فقدان تخمک‌گذاری
 ۱۰۷- در جواب آزمایش باب‌اسمیر خانم یانسه‌ای وجود سلول‌های آندوسرویکال گزارش شده است. اقدام بعدی چیست؟
 (الف) اقدامی ندارد
 (ب) تکرار باب‌اسمیر
 (ج) کولپوسکوپی
 (د) بیوپسی اندومتر
 ۱۰۸- مکانیسم کاهش باروری در آندومتروپوز متوسط یا شدید چیست؟
 (الف) چسبندگی در ناحیه تخمدان‌ها و لوله‌های رحمی
 (ب) نارسایی فولیکولار
 (ج) سیکل‌های نامنظم قاعدگی
 (د) افزایش میزان E2 خون در مرحله قبل از تخمک‌گذاری
 ۱۰۹- خانمی ۲۴ ساله با سابقه ۳ سقط مکرر و آنتی‌بادی کاردیولولین مثبت مراجعه کرده است. درمان پیشنهادی در حاملگی بعدی کدام است؟
 (الف) دوز کم آسپرین به اضافه استروئیدها
 (ج) دوز کم آسپرین به تنهایی
 (ب) دوز کم آسپرین به اضافه ویتامین C
 (د) تأکید بر کدام است؟
 ۱۱۰- برای کاهش درد به روش دکتر دیک‌رید (Dick Read) تأکید بر کدام است؟
 (الف) شرطی کردن درد زایمان
 (ج) کاهش ترس از زایمان
 (ب) افزایش تحرکات برای سرگرمی مادر
 (د) اختلال در مسیر درک درد

بیماری‌های زنان و ناباروری

- ۱۱۱- برای نمونه‌برداری از آندومتر جهت بررسی علل نازایی، کدام زمان از سیکل قاعدگی مناسب است؟
 (الف) اوایل فاز تکثیر رحم
 (ج) اواسط فاز لوتئینی تخمدان
 (ب) یک روز قبل از تخمک‌گذاری
 (د) اواخر فاز ترشحی رحم
 ۱۱۲- خانمی ۲۸ ساله با درد زیر شکم در سمت راست مراجعه نموده است. در مشاهدات سونوگرافی توده‌ای توپر به قطر ۶×۵ سانتی‌متر در تخمدان راست مشاهده می‌شود. کدام اقدام ارجح است؟
 (الف) تحت نظر داشتن بیمار و معاینات مکرر هر ۶ ماه یکبار
 (ج) تجویز OCP و تکرار سونوگرافی سه هفته بعد
 (ب) لاپاراسکپی و برداشتن توده
 (د) تکرار سونوگرافی

۱۳۵- کدام شاخص به منظور بررسی تأثیر مصرف روزانه ۲ عدد قرص آهن طی یک ماه در مادر بارداری که در سه ماهه دوم بارداری اش دارای هموگلوبین ۱۰ میلی گرم در دسی لیتر بوده، صحیح است؟
 (الف) متوسط حجم گلبولی
 (ب) افزایش حجم رتیکولوسیتها
 (ج) قرینش
 (د) سطح سرمی آهن

۱۳۶- طبق دستورالعمل کشوری در مورد کودک سالم، کدامیک از موارد زیر در مورد تغذیه شیرخوار با شیر مادر صحیح نیست؟
 (الف) طی هفته اول تولد، اگر کودک خودش در شب بیدار نشود، باید او را بعد از ۳ ساعت جهت شیردهی بیدار نمود
 (ب) طی هفته اول تولد، ۸-۱۰ بار شیردهی در ۲۴ ساعت کافی می باشد
 (ج) طی ۱ هفته تا ۶ هفته، حداقل ۸ بار شیردهی در ۲۴ ساعت کافی می باشد
 (د) طی ۸-۱۰ ماهگی، حداقل ۸ بار شیردهی در ۲۴ ساعت کافی می باشد

نوزادان

۱۳۷- اولین و شایع ترین نشانه دیسترس تنفسی در نوزادان کدام است؟
 (الف) رتراکسیون قفسه سینه
 (ب) میانوز
 (ج) تنفس بیش از ۶۰ بار در دقیقه
 (د) صدای ناله انهای ذمی

۱۳۸- عامل مؤثر بر امتناز آنگار منفی کاذب کدام است؟
 (الف) سولفات منیزیم
 (ب) نوروپاتی مادرزادی
 (ج) آنزیم کوآن
 (د) اسیدوز مادر

۱۳۹- در هنگام بررسی نوزاد دختر، کدام یافته غیرطبیعی محسوب می شود؟
 (الف) خوتربیزی از واژن
 (ب) عدم دفع مکنونیم در ۲۴ ساعت اول
 (ج) بزرگی کلیتوریس و برجسته بودن لب های کوچک
 (د) تورم و سفیدی پستان ها

۱۴۰- عارضه گرن ایکترس از پیامدهای عدم کنترل کدام بیماری در نوزاد است؟
 (الف) گالاکتوزومی
 (ب) فنیل کتونوری
 (ج) هیپویریدیم مادرزادی
 (د) هیپر بیلی روبینمی

۱۴۱- در معاینه چشم نوزاد میکروسفال تازه متولد شده، اسکار ماکولا و لکه های کوچک در شبکه مشاهده شده است. محتمل ترین علت کدام است؟
 (الف) یارووپروس
 (ب) یارووپروس
 (ج) سوء تغذیه دوران بارداری
 (د) ترومای شدید مادر در دوران بارداری

۱۴۲- علت اوروپاتی انسدادی در نوزاد کدام است؟
 (الف) سندرم مثانه بزرگ، کولون کوچک، کاهش پرستالتیسم روده ای
 (ب) هیدروپوتر و نفروز دوطرفه
 (ج) اولیگو هیدرو آمینوس
 (د) هیپوبلازی ربوی

۱۴۳- کدامیک از حملات زیر در خصوص پلتورا صحیح است؟
 (الف) در نوزادان پره ترم شایع است.
 (ب) در پلی ستمی دیده می شود.
 (ج) ناشی از کم خونی است.
 (د) در نتیجه ضخیم شدن پوست اتفاق می افتد

۱۴۴- در معاینه چشم نوزادی قطر قرنیه بیش از یک سانتی متر است و فوتوفوبی و اشک ریزش مشاهده می شود. کدام عارضه بیشتر مطرح است؟
 (الف) کاناراکت
 (ب) کوریورینیت
 (ج) گلوکوم
 (د) رتینوپاتی نارس

۱۴۵- ادم لوکالیزه در نوزاد کدام یک از موارد زیر را بیشتر مطرح می کند؟
 (الف) تارس بودن
 (ب) کوریورینیت
 (ج) هیپرناترمی ثانویه به اریتروبلاستوز
 (د) ناهنجاری مادرزادی غدد لنفاوی

۱۱۳- در خانمی هیپوتیروئید با مشکل DUB احتمال کدام عارضه بیشتر است؟

- (الف) منورژی
(ب) اولیگو منوره
(ج) آمنوره
(د) هیومنوره

۱۱۴- مددجو با شکایت دیسمنوره دیسپارولنی - درد لگنی و نازایی مراجعه نموده و دارای طول سبکل کوتاه شده و مدت قاعدگی طولانی است. تشخیص احتمالی کدام است؟

- (الف) PID
(ب) اندومتریوز
(ج) آدنومیوز
(د) سالیسیت

۱۱۵- کدام یک از موارد زیر از تشخیص های افتراقی منارک زودرس نیست؟

- (الف) سنلرم مک کال - البرایت
(ب) هیپرتیروئیدی اولیه
(ج) تروما
(د) سوء استفاده جنسی

۱۱۶- دختری ۱۲ ساله با دردهای کولیکی و گرامپ های سوپراپوبیک و تشخیص دیسمنوره اولیه مراجعه نموده است. درمان انتخابی چیست؟

- (الف) نورکتومی
(ب) قرص OCP
(ج) آنتی پروستاگلاندین
(د) طب سوزنی

۱۱۷- در ارتباط با تشخیص لیومیوم زیر مخاطی کدام روش مناسب نیست؟

- (الف) هیستروسکوپی
(ب) اولتراسونوگرافی
(ج) سونو هیستروگرام
(د) هیسترو لینگوگرام

۱۱۸- برای غربالگری سرطان تخمدان، انجام کدام روش به صورت ترکیبی پیشنهاد می شود؟

- (الف) CA-125 / سونوگرافی / معاینه فیزیکی
(ب) LDH / لاپاروسکوپی
(ج) HCG / سونوگرافی / لاپاروسکوپی
(د) AFP / معاینه فیزیکی / سونوگرافی

۱۱۹- بیشترین احتمال CIN در چه زمانی است؟

- (الف) در زمان استفاده از OCP
(ب) منارک
(ج) پائینگی
(د) قبل از حاملگی

۱۲۰- کدامیک از موارد زیر درباره خطر ابتلا به سرطان پستان صحیح است؟

- (الف) با افزایش سن زنان، خطر ابتلا آنان به سرطان پستان کاهش می یابد.
(ب) هرچه دوران تولیدمثل زنان طولانی تر باشد، خطر ابتلا به سرطان پستان کاهش می یابد.
(ج) سابقه خانوادگی سرطان پستان، از عوامل خطر کاملاً شناخته شده ابتلا به سرطان است.
(د) پائینگی زودرس در زنان، باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان می شود.

بهداشت مادر و کودک

۱۲۱- خانمی با نوزاد ۲۳ روزه، بیان می کند که از روز پنجم پس از زایمان، احساس خستگی اش شروع شده است. او

انرژی کمی برای مراقبت از نوزاد دارد و گهگاهی گریه می کند. تشخیص احتمالی و اقدام مناسب یک ماما چیست؟

- (الف) افسردگی پس از زایمان - ارجاع به متخصص روان
(ب) سایکوز پس از زایمان - ارجاع به متخصص روان
(ج) اندوه بچه - ارجاع به متخصص روان
(د) اندوه بچه - ویزیت مجدد هفته بعدی

۱۲۲- جهت مبارزه با کمبود روی در کودکان، رایج ترین حامل غذایی برای اضافه کردن روی کدام است؟

- (الف) شکر
(ب) گندم
(ج) شیر خشک
(د) آرد غلات

۱۲۳- جهت کمک به پیاده سازی سیاست های کلی جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،

مناسب ترین رویکرد آموزش بهداشت کدام است؟

- (الف) رویکرد قانونی
(ب) رویکرد خدماتی
(ج) رویکرد آموزشی
(د) رویکرد مراقبت های بهداشتی اولیه

- ۱۲۴- سببگار کشیدن همراهِ داشتن سابقه فامیلی به عنوان کدام عامل خطر در بروز سرطان پستان محسوب می شود؟
 الف) Proxy for need
 ج) علیش
 ب) تشدید
 د) تجمیع
- ۱۲۵- آموزش روش انجام خودآزمایی پستان بر روی ماکت به زنان مراجعه کننده جهت دریافت مراقبت های سلامت باروری به مراکز بهداشتی چه نام دارد؟
 الف) نقش بازی
 ج) تمرین شبیه سازی
 ب) نمایش عملی
 د) آموزش برنامه ریزی شده
- ۱۲۶- غربالگری سرطان سرویکس در طبقات اجتماعی پایین جامعه چه نوع غربالگری است؟
 الف) خشکنشی
 ج) انتخابی
 ب) تجویزی
 د) چند مرحله ای
- ۱۲۷- همه موارد زیر از اهداف برنامه کشوری صندوق جمعیت ملل متحد است، به جز:
 الف) تأمین حقوق باروری برای همه زوجین
 ج) کاهش نابرابری جنسیتی زن و مرد
 ب) ارتقاء و پایش عهدنامه حقوق کودک
 د) بهبود وضعیت بهداشت باروری
- ۱۲۸- طبق دستورالعمل کشوری در مورد کودک سالم، وارنیش فلوراید برای کودک از چه زمانی و هر چند ماه یکبار لازم است انجام شود؟
 الف) از سه سالگی، هر شش ماه
 ج) از دو سالگی، هر یک سال
 ب) از دو سالگی، هر شش ماه
 د) از سه سالگی، هر یک سال
- ۱۲۹- در الگوی جامع آموزش بهداشت، تعیین اهداف ویژه عملیاتی، تدوین فعالیت ها، تعیین منابع و تدوین مراحل ارزشیابی در کدام مرحله صورت می گیرد؟
 الف) تعیین اهداف
 ج) طراحی برنامه
 ب) تعریف مشکلات
 د) فعالیت های اجرایی
- ۱۳۰- چنانچه بخواهیم در یک مادر تک فرزند با تغییر نگرش، تقویت احساس کارایی فردی و نقش دیگران مهم، قصد او را در جهت فرزندآوری بیشتر، تقویت کنیم، با کاربست کدام تئوری اقدام به تغییر رفتار می کنیم؟
 الف) مدل اعتقادی بهداشتی
 ج) نظریه یادگیری اجتماعی
 ب) الگوی مراحل تغییر
 د) تئوری رفتار برنامه ریزی شده
- ۱۳۱- در الگوی برنامه ریزی پرستید - پروسید، ارزشیابی تأثیرات بلندمدت برنامه همانند تغییر در کیفیت زندگی و شاخص های بهداشتی کدام نوع ارزشیابی است؟
 الف) ارزشیابی مرحله اجرا
 ج) ارزشیابی نتیجه
 ب) ارزشیابی فرایند
 د) ارزشیابی تأثیر
- ۱۳۲- در جامعه ای اطلاعات زیر وجود دارد:
 تعداد تولد زنده در سال: ۷۰۰۰ مورد / تعداد موارد مرگ نوزاد از بدو تولد تا ۷ روزگی: ۲۵ مورد / تعداد مرگ نوزاد تا ۲۸ روزگی: ۵۰ مورد / تعداد موارد مرگ از ۲۸ روزگی تا یکسالگی: ۲۵ مورد.
 همه شاخص های زیر قابل محاسبه است، بجز:
 الف) PMR
 ب) NMR
 ج) PNMR
 د) IMR
- ۱۳۳- کودک متولد شده در ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ و بدون سابقه قبلی واکسیناسیون، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ به مرکز جهت تزریق واکسن آورده شده است. در این مراجعه چه واکسن هایی به این کودک باید تزریق شود؟
 الف) سه گانه، هپاتیت ب، فلج اطفال خوراکی، فلج اطفال تزریقی، MMR
 ب) پنتاوالان، فلج اطفال خوراکی، فلج اطفال تزریقی، MMR
 ج) سه گانه، هپاتیت ب، فلج اطفال خوراکی، MMR
 د) پنتاوالان، فلج اطفال خوراکی، MMR

۱۵۵- علی فر آیند. تکوین قلب کدام ساختار زیر از شاخ سینوسی چپ به وجود می آید؟

(ب) سینوس کروناری

(الف) دریچه ورید اجوف تحتانی

(د) شیب انتهایی

(ج) سینوس وتروم

۱۵۶- باقی ماندن مجرای دهلیزی - بطنی اولیه (Persistent atrioventricular canal) با همه ناهنجاری های زیر همراه است به جز ...؟

(ب) نقص دیواره بین دهلیزی

(الف) نقص دیواره بین بطنی

(د) نقص دریچه های سه لته و دولته

(ج) نقص دریچه های سیبکی

۱۵۷- قسمت تحتانی مجرای مزوتفرس در جنس مونث در حین تکامل می تواند کدامیک از ساختارهای زیر را به وجود آورد؟

Appendix testis (ب)

Epoophoron (الف)

Gartner's cyst (د)

Paroophoron (ج)

۱۵۸- در صورتی که با حرکات جنین، ضربان قلب جنین افزایش نیابد، تفسیر شما به عنوان عاما کدام است؟

Nonreactive (ب)

Reactive (الف)

(د) طبیعی است

(ج) رضایت بخشی نیست

۱۵۹- برای ارزیابی رشد ریه های جنین کدام روش ارزیابی را توصیه می کنید؟

(الف) اولتراساوند

(ب) نمونه گیری از پوره های کوریون

(ج) آمنیوسنتز

(د) الکتروکاردیوگرافی

۱۶۰- رباط گرد کبدی در اثر بسته شدن کدام ساختار زیر به وجود می آید؟

(ب) شریان نافی

(الف) ورید نافی

(د) مجرای شریانی

(ج) مجرای وریدی

۱۶۱- کدام مرحله جنینی حساس ترین دوره زندگی درون رحمی نسبت به عوامل نوتوزن است؟

(الف) مرحله پیش از لانه گذاری

(ب) طی مدت زمان لانه گذاری

(ج) هفته سوم تا هفتم حاملگی

(د) هفته نهم تا پایان حاملگی

۱۶۲- کدامیک از موارد زیر علت رقیق شدن موکوس گردن رحم را بیان می کند؟

(ب) کاهش ترشح غدد رحمی

(الف) افزایش پروژسترون استروژن

(د) کاهش جریان خون سرخرگ های رحمی

(ج) زیاد شدن تولید فولیکولی

۱۶۳- بزرگ های اولیه در حین تکامل جفت در کدام هفته تشکیل می شوند؟

(د) اول

(ج) دوم

(ب) سوم

(الف) چهارم

۱۶۴- به منظور ارزیابی سلامت جنین در حاملگی چندقلو کدام اقدام ممنوع است؟

(ب) تست استرس

(الف) مارتینوس جراحی جنین

(د) آمنیوسکوپی

(ج) تست بدون استرس

۱۶۵- بهترین زمان بررسی آنومالی های جنین کدام است؟

(الف) ۱۷-۱۰ روز بعد از تشخیص حاملگی

(ب) ۵۶-۱۷ روز بعد از تشخیص حاملگی

(ج) ۱۷-۱۰ روز بعد از تشخیص صدای قلب

(د) ۵۶-۱۷ روز بعد از لقاح

۱۴۵- در نوزاد مبتلا به دیسترس تنفسی حاد در صورت طبیعی بودن ریه‌ها در رادیوگرافی قفسه سینه، کدامیک از موارد زیر بیشتر مطرح است؟
(الف) کم‌خونی
(ب) منفرجه دیسترس تنفسی
(ج) منفرجه دیسترس تنفسی
(د) کم‌خونی

۱۴۶- ساکشن مجاری تنفسی احتمال بروز کدام عارضه در نوزاد را افزایش می‌دهد؟
(الف) برنکولیت
(ب) تاکی کاردی
(ج) آپنه‌ایسون
(د) مننژیت

۱۴۷- ضربان قلب نوزاد ۵ دقیقه پس از تولد، ۷۰ ضربه در دقیقه - تنفس نامنظم و آهسته - رنگ پریده - با ورود کاتتر به داخل بینی عطسه می‌کند و اندام‌ها دارای فلکسیون است. نمره آپگار دقیقه ۵ نوزاد چقدر است و اقدامات بعدی کدام است؟

(الف) ۷ تا یک ساعت هر ۵ دقیقه امتیاز آپگار اندازه‌گیری می‌شود.
(ب) ۵ تا ۲۰ دقیقه هر ۵ دقیقه امتیاز آپگار کنترل می‌شود.
(ج) ۷ تا ۱۰ نیاز به پیگیری ندارد.
(د) ۵ احتیاج فوری نیاز است.

۱۴۸- همه گزینه‌ها برای ترخیص نوزاد ۳۷ هفته با لیس و زایمان بدون عارضه صحیح است. به جز؟
(الف) تنفس ۶۸ بار در دقیقه
(ب) دفع یک بار مدفوع
(ج) حداقل دو بار تغذیه مؤلفه‌آمیز و بدون عارضه
(د) درجه حرارت زیربغل ۳۶.۵-۳۷.۴ درجه سانتی‌گراد در نمونه بار

۱۴۹- وجود مناطق نرم در ناحیه پس سری نوزاد ممکن است با کدام عارضه همراه باشد؟
(الف) آپلاری مادرزادی پوست سر
(ب) پلاکیوسفالی ناشی از تغییر شکل
(ج) استوزنر اسپرنگت
(د) تریزومی ۱۳

۱۵۰- در نوزاد متولد شده از مادر دیابتیک در خصوص سطح گلوکز خون، کدام اقدام صحیح است؟
(الف) اگر بدون علامت باشد، نیاز به بررسی نیست.
(ب) بلافاصله بعد از زایمان در همه نوزادان انجام می‌شود.
(ج) در عرض ۳۰ دقیقه اول بعد از زایمان و قبل از تغذیه یا شیر ماتی باید انجام شود.
(د) بعد از تغذیه از شیرمادر طی یک ساعت اول و دوم زندگی باید انجام شود.

جنین‌شناسی

۱۵۱- الگوی افت متغیر ضربان قلب جنین در تست استرس انقباضی (CST) بیانگر کدام مورد زیر است؟
(الف) اولیگو هیدرو آمنیوس
(ب) پلی هیدرو آمنیوس
(ج) طبیعی
(د) ارزش تشخیص ندارد

۱۵۲- در ارتباط با منشأ بخش مادری جفت کدام گزینه صحیح است؟
(الف) دسیدوای کپسولی
(ب) دسیدوای قاعده‌ای
(ج) کوریون صاف
(د) کوریون فروندوزوم

۱۵۳- تشریح سورفاکتانت از کدام سلول‌ها و در چه زمانی شروع می‌شود؟
(الف) پنوموسیت‌های نوع II از هفته ۲۷ جنینی به بعد
(ب) پنوموسیت‌های نوع I از هفته ۲۶ جنینی به بعد
(ج) پنوموسیت‌های نوع II از هفته ۱۸ جنینی به بعد
(د) پنوموسیت‌های نوع II از هفته ۲۲ جنینی به بعد

۱۵۴- کدامیک از عوامل عفونی زیر موجب گلسی فیکاسیون مغزی در جنین می‌شود؟
(الف) ویروس سرخچه
(ب) توکسوپلاسموز
(ج) ویروس HIV
(د) واریسلا زوستر

«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

اینجا کلیک نمایید



ایران استخدام

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir 

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۱۱۳ 

Www.IranEstekhdam.Ir