



## سوالات تخصصی کارشناس آمار سال ۸۷



**بخش اول:**

---

**زبان تخصصی**

1- Let X be an (absolutely) continuous random variable. then , ([www.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- 1) the probability that X takes a given value of X is not known
- 2) the probability that X takes a given value of X equals one
- 3) the probability that X takes a given value of X equals to  $f_X(x)$
- 4) the probability that X takes a given value of X equals to Zero

2-In statistical terms, a .... Can be any set or collection of objects. ([www.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- 1) set
- 2) number
- 3) population
- 4) sample

3-A sampling distribution is nothing more than the probability .... Function for the statistic.

([www.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- 1) mathematical
- 2) density
- 3) random
- 4) variable

4-For the mean test, the details differ, depending upon what ..... we are able to make.

([www.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- 1) assumption
- 2) samples
- 3) sets
- 4) hypotheses

5-It is very often useful to compute ....., to compare variability between different sets of data.

([www.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- 1) mean deviation
- 2) variance
- 3) coefficient of deviation
- 4) standard deviation

6-Identify the level of measurement used in the following. Ali, who is different in many ways, measures time in days, with 0 corresponding to his birth date. The day before his birth is -1, the day after his birth is +1, and so on. Ali has converted the dates of major historical events to his numbering system. What is the level of measurement of these numbers? ([www.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- 1) nominal
- 2) interval
- 3) ordinal
- 4) ratio

7-Human body temperatures have a mean of  $98.20^\circ$  and a variance of  $0.64^\circ$ . An emergency room patient is found to have a temperature of  $101^\circ$ . Convert  $101^\circ$  to a z score. Is that temperature unusually high? What does it suggest? ([www.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- 1) 4.38, yes , patient is ill
- 2) 4.38, No , patient is not ill
- 3) 3.5, yes , patient is ill
- 4) 3.5, No , patient is not ill

8-Complete this sentence The ..... (also called the H test) is a nonparametric test that uses ranks of sample data from three or more independent populations. It is used to test the null hypothesis that the independent samples come from populations with the same distribution; the alternative hypothesis is the claim that the population distributions are different in some way.

([www.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- 1) Kruskal-Wallis Test
- 2) Wilcoxon Rank-Sum Test
- 3) Wilcoxon Signed-Rank Test
- 4) Rank correlation Test

9-wich sentences is not correct? ([Www.iranestekhdam.ir](http://Www.iranestekhdam.ir))

- 1) standard deviation of population is often called the standard error of mean
- 2) the best point estimate of population proportion is sample proportion.
- 3) the sample mean is the best point of the populationmean.
- 4)  $S^2$  is the best point estimate of variance of population.

10- if two of the items shown below are randomly selected . find the probability that both items are colored green . this items are used in test of proportion.

Red , yellow , green , red , blue , green , yellow

Assume that non of the selected items is replace before the other are selected.

([Www.iranestekhdam.ir](http://Www.iranestekhdam.ir))

- 1)  $\frac{4}{49}$
- 2)  $\frac{4}{42}$
- 3)  $\frac{2}{49}$
- 4)  $\frac{2}{42}$



بخش دوم:

آمار کاربردی

۱۱- سطح زیر منحنی  $H_0$  در آزمون فرض آماری همواره برابر است با: (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) سطح اطمینان آزمون (۲) خطای نوع دوم  
(۳) خطای نوع اول (۴) به تعریف  $H_0$  بستگی دارد

۱۲- در تحلیل واریانس یک عامله اگر تعداد تیمارها ۳ و  $SST = 50$  و  $SSE = 18$  باشد  $SS(T_r)$  با کدام یک از گزینه های

ذیل برابر است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) 68 (۲) 36 (۳) 32 (۴) اطلاعات کافی نیست

۱۳- در تحلیل واریانس دو عامله (با تاثیر متقابل) اگر تعداد تیمارها ۳، تعداد بلوکها ۵ و در هر سلول ۲ مشاهده وجود داشته

باشد. آنگاه ناحیه بحرانی در سطح ۵ درصد برای فرض  $H'_0$  عبارت است از: (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱)  $F_B > F_{0/05,3,15} = ?$  (۲)  $F_B \geq F_{0/25,4,15} = ?$   
(۳)  $F_B \geq F_{0/5,4,15} = ?$  (۴) هیچکدام

۱۴- تفسیر  $P(-25/1 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq -6/7) = 0/95$  این است که در سطح خطای ۵ درصد می توان ادعا کرد:

(Www.iranestekhdam.ir)

- (۱)  $\mu_1 < \mu_2$  (۲)  $\mu_1 = \mu_2$   
(۳)  $\mu_1 > \mu_2$  (۴) اطلاعات برای اظهار نظر کافی نیست

۱۵- توان آزمون برابر است با احتمال ..... (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) رد  $H_0$  وقتی که نادرست است (۲) رد  $H_1$  وقتی که نادرست است  
(۳) قبول  $H_0$  وقتی که درست است (۴) قبول  $H_1$  وقتی که درست است

۱۶- برای آزمون برابری میانگین سه جامعه نرمال یک نمونه ۵ تایی از هر جامعه انتخاب شده و اطلاعات زیر محاسبه شده است

مقدار آماره آزمون کدام است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

$$\bar{X}_1 = 5 \quad \bar{X}_2 = 10 \quad \bar{X}_3 = 15$$

$$S_1^2 = 9 \quad S_2^2 = 25 \quad S_3^2 = 41$$

$$f = 5 \text{ (۴)} \quad f = 3/5 \text{ (۳)} \quad f = 4 \text{ (۲)} \quad f = 2/5 \text{ (۱)}$$

۱۷- برای مشاهداتی، معادله رگرسیون خطی برآوردی به صورت  $\hat{Y} = 10/25 + 0/7X_1 - 18/03X_2$  بوده است آیا فرض

$B_1 = 0$  را در سطح معنی داری ۵ درصد می پذیرید؟ چرا؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) بلی، چون ۰/۷ مقدار کوچکی است (۲) خیر، چون ۰/۷ مقدار کوچکی نیست  
(۳) برای پاسخ نیاز به K و n داریم (۴) جواب به خطای معیار  $b_1$  و تعداد مشاهدات بستگی دارد

۱۸- اگر  $\sum (y - \bar{y})^2 = \sum (y - \bar{y}^2)$  باشد آنگاه ضریب همبستگی با کدامیک از این موارد برابر است؟

(Www.iranestekhdam.ir)

(۱) یا ۰ (۲) -۱ یا ۰ (۳) -۱ یا ۱ (۴) ۱

۱۹- کدامیک از معادلات نمی تواند معادله سهمی باشد؟ ([Www.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

(۱)  $y = -5 + x^2$  (۲)  $y = 10x - 8x^2$

(۳)  $y = -5 + 10x$  (۴)  $y = 10x + 8x^2$

۲۰- اگر ضریب همبستگی بین دو متغیری ۰/۶ و دو متغیر دیگر ۰/۳ باشد میتوان گفت همبستگی دو متغیر اول «چند برابر» قویتر از دو متغیر دوم است؟ ([Www.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

(۱) دو برابر (۲) سه برابر (۳) چهار برابر (۴) نه برابر

۲۱- حجم نمونه چقدر باشد تا توزیع  $\bar{X}$  همان توزیع  $X$  شود؟ ([Www.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

(۱)  $n = N$  (۲)  $n = 1$  (۳)  $n = 30$  (۴)  $n > 30$

۲۲- میانگین توزیع نمره های دانشجویان یک دانشکده ۵۲ و انحراف معیار آن ۱۵ است احتمال اینکه میانگین یک نمونه تصادفی ۱۰۰ نفره کمتر از ۵۵ باشد چقدر است؟ ([Www.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

(۱) ۰/۹۹۶۲ (۲) ۰/۹۷۷۲ (۳) ۰/۰۰۳۸ (۴) ۱

۲۳- کدامیک از گزینه های ذیل صحیح است. ([Www.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- (۱) میانگین هر نمونه  $n$  تایی با میانگین جامعه برابر است.
- (۲) قضیه حد مرکزی ، صرفا مربوط به نمونه گیری از جوامع نامتقارن است
- (۳) رفتار توزیع نمونه گیری  $\bar{P}$  از قضیه حد مرکزی تبعیت میکند
- (۴) روش نمونه گیری خوشه ای از روش نمونه گیری گروهی دقیقتر است.



بخش سوم:

احتمال و کاربرد آن

۲۴- می‌خواهیم یک کمیته ۵ نفری از بین ۵ مدیر و ۳ کارشناس تشکیل دهیم احتمال اینکه در این کمیته ۳ مدیر و ۲ کارشناس انتخاب شوند چقدر است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

(۱)  $\frac{1}{56}$  (۲)  $\frac{5}{28}$  (۳)  $\frac{15}{28}$  (۴)  $\frac{12}{56}$

۲۵- موشکی را برای زدن به منطقه ای با هدفهای A و B پرتاب می‌کنیم. اگر احتمال زدن به هدف A برابر ۰/۴ و احتمال B برابر ۰/۵ باشد و بدانیم که هدف A زده نشده باشد احتمال زدن B چقدر است. (Www.iranestekhdam.ir)

(۱)  $\frac{1}{6}$  (۲)  $\frac{5}{6}$  (۳)  $\frac{2}{6}$  (۴)  $\frac{3}{4}$

۲۶- اگر تابع چگالی احتمال X بصورت زیر باشد A چقدر است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

$$F(X) = \begin{cases} \frac{3}{4}x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ A e^{-x} & x > 1 \end{cases}$$

(۱)  $\frac{3}{4}e$  (۲)  $-\frac{3}{4}e$  (۳)  $\frac{4}{3}e$  (۴)  $-\frac{4}{3}e$

۲۷- تیراندازی ۴۰٪ به هدف می‌زند احتمال اینکه از ۵ تیر که رها می‌کند ۳ تا به هدف اصابت کند چقدر است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

(۱)  $\frac{145}{625}$  (۲)  $\frac{144}{625}$  (۳)  $\frac{146}{625}$  (۴)  $\frac{24}{100}$

۲۸- فرض A و B در پیشامد از فضای نمونه ای  $\Omega$  هستند، بطوری که  $P(A) = 0/2$ ,  $P(B) = 0/4$ , و  $P(A \cap B) = 0/06$  است. در اینصورت  $P(A \cap \bar{B})$  برابر است با: (Www.iranestekhdam.ir)

(۱) 0/1 (۲) 0/12 (۳) 0/14 (۴) 0/17

۲۹- اگر تعداد مشتریانی که وارد یک بانک می‌شوند یک متغیر تصادفی پواسون با متوسط ۱۲ نفر در ساعت باشد مطلوب است احتمال اینکه فاصله زمانی بین ورود دو مشتری کمتر از ۱۵ دقیقه باشد: (Www.iranestekhdam.ir)

(۱)  $1 - e^{-3}$  (۲)  $e^{-5/4}$  (۳)  $e^{-3}$  (۴)  $1 - e^{-5/4}$

۳۰- گشتاور پنجم در جدول احتمال زیر کدام است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

|          |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| $X_i$    | -2            | 1             | 3             |
| $f(X_i)$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |

(۱) ۲۸/۵ (۲) ۳۲/۵ (۳) ۴۵ (۴) ۵۴

۳۱- در توزیع مشترک X و Y زیر  $Cov(X, Y)$  کدام است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

| Y \ X | 0             | 1             | 2             | 3             |                    |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|       | 0             | $\frac{1}{8}$ | $\frac{2}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{2}$ (۴)  |
| 0     | 0             | $\frac{1}{8}$ | $\frac{2}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $-\frac{1}{2}$ (۳) |
| 1     | $\frac{1}{8}$ | $\frac{2}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | 0             | $\frac{1}{4}$ (۲)  |
|       |               |               |               |               | $-\frac{1}{4}$ (۱) |

۳۲- ۰/۲ تولیدات کارخانه ای معیوب است احتمال اینکه سومین کالای کنترل شده اولین کالای معیوب باشد کدام است؟

(Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) ۰/۰۸۲ (۲) ۰/۱۲۸ (۳) ۰/۱۴۲ (۴) ۰/۰۵۲

۳۳- کمیت تصادفی  $X$  بر طبق قانون هندسی بصورت  $P(X) = P \cdot q^{x-1}$  که  $X = 1, 2, 3, \dots$  توزیع شده است تابع مولد گشتاور برای قانون توزیع هندسی کدام است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

(۱)  $m_x(t) = \frac{qe^t}{1-pe^t}$  (۲)  $m_x(t) = \frac{p}{1-qe^t}$  (۳)  $m_x(t) = \frac{pe^t}{1-qe^t}$  (۴)  $m_x(t) = \frac{pe^t}{1+qe^t}$

۳۴- اگر متغیرهای تصادفی  $X$  و  $Y$  دارای تابع چگالی احتمال مشترک زیر باشد

$$F(x, y) = \begin{cases} 2 & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{در غیر اینصورت} \end{cases}$$

در اینصورت کدام رابطه صحیح است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱)  $P(x < y) = 1$  (۲)  $X$  و  $Y$  مستقل اند  
(۳)  $P(2x < y) = 1$  (۴)  $P(x > y) = \frac{1}{2}$

۳۵- یک فاصله اطمینان ۹۵٪ برای میانگین یک جامعه نرمال که واریانس آن مشخص  $\sigma^2$  است به صورت  $(\bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$  می باشد. اگر بخواهیم طول این فاصله اطمینان را به نصف کاهش دهیم لازم است که:

(Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) تعداد نمونه را دو برابر کنیم (۲) تعداد نمونه را چهار برابر کنیم  
(۳)  $\sigma$  را نصف کنیم (۴)  $\sigma$  را دو برابر کنیم

۳۶- هرگاه در تابع توزیع دو جمله ای  $E(x) = 20$  و  $\sigma_x^2 = 12$  باشد تعداد آزمایش ها کدام است؟

(Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) ۸۰ (۲) ۱۰۰ (۳) ۶۰ (۴) ۵۰

۳۷- متغیر تصادفی ناپیوسته دارای  $E(x^2) = 34$  و انحراف معیار ۳ است میانگین کدام است؟

(Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۵ (۴) ۶



بخش چهارم:

فرآیندهای تصادفی

۳۸- ۸۰ درصد محصولات کارخانه ای سالم است ، احتمال اینکه از ۴ کالای خریداری شده از این کارخانه یک کالا سالم باشد چقدر است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱)  $\frac{12}{625}$  (۲)  $\frac{16}{625}$  (۳)  $\frac{24}{625}$  (۴)  $\frac{5}{16}$

۳۹- اگر توزیع دو جمله ای  $p=0.25$  باشد. نمودار احتمال آن چه شکلی خواهد داشت؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) متقارن (۲) چوله به چپ (۳) چوله به راست (۴) به  $n$  بستگی دارد

۴۰- تعداد سرکشیهای اضطراری به یک خط تولید دارای توزیع پواسون با متوسط ۳ سرکشی در روز است. احتمال اینکه در یک روز هیچ سرکشی ای صورت نگرفته باشد. چقدر است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱)  $e^{-3}$  (۲)  $3e^{-3}$  (۳)  $2e^{-3}$  (۴)  $\frac{1}{3}e^{-3}$

۴۱- اگر  $V(x) = \frac{1}{2}$  و  $V(y) = \frac{2}{3}$  و  $V(x+y) = \frac{5}{6}$  باشد . آنگاه کدام عبارت صحیح است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱)  $Cov(x, y) = \frac{1}{3}$  (۲)  $Cov(x, y) = \frac{1}{2}$   
(۳)  $Cov(x, y) = -\frac{1}{6}$  (۴)  $Cov(x, y) = -\frac{1}{4}$

۴۲- به ازای چه مقداری از  $K$  این تابع می تواند تابع چگالی احتمال باشد؟ (Www.iranestekhdam.ir)

$$F(x) = \begin{cases} KX^2, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{در غیر اینصورت} \end{cases}$$

- (۱)  $\frac{1}{4}$  (۲)  $\frac{3}{16}$  (۳)  $\frac{3}{64}$  (۴)  $\frac{1}{16}$

۴۳- میانگین و واریانس توزیع نرمال استاندارد به ترتیب (از چپ به راست) کدامند؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) (۰ و ۱) (۲) (۱ و ۰) (۳) (۱ و ۱) (۴) (۰ و ۰)

۴۴- اگر اندازه دو نفر از جامعه نرمالی ، ۱۳ و ۱۹ و اندازه این دو نفر بر حسب متغیر استاندارد  $Z$  ، صفر و ۳ باشد، میانگین و انحراف معیار (به ترتیب از چپ به راست) کدامند؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) (۶ و ۳) (۲) (۱۹ و ۳) (۳) (۱۳ و ۲) (۴) (۱۹ و ۱)

۴۵- اگر متغیر تصادفی  $X$  دارای توزیع نرمال با میانگین ۵۰ باشد،  $P(x \leq 50)$  کدام است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) صفر (۲)  $\frac{1}{2}$  (۳)  $\frac{3}{4}$  (۴) ۱



**بخش پنجم:**

**سری های زمانی**

۴۶- کدامیک از گزینه های ذیل صحیح است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) هر سری زمانی همواره تغییرات فصلی دارد
- (۲) مدل پیشبینی نمو همواره ساده «روند» را در نظر می گیرد
- (۳) مدل میانگین متحرک ساده مرکزی یک مدل پیش بینی کیفی است
- (۴) از میانگین متحرک ساده مرکزی برای هموار سازی سری زمانی استفاده می شود

۴۷- کدامیک از گزینه های ذیل صحیح است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) هر مدلی که MSE بزرگتری داشته باشد از صحت پیش بینی بالاتری برخوردار است
- (۲) مدل های اقتصاد سنجی یک مدل علی- معلولی است
- (۳) مدل های ARIMA صرفا برای سری زمانی غیر ایستا استفاده می شوند
- (۴) مدل های تلفیقی در پیش بینی فقط از ترکیب دو مدل خاص حاصل می شوند

۴۸- در مدل نموهموار ساده اگر  $\alpha = 0.10$  باشد. تعداد دوره های سری زمانی حداکثر چقدر می تواند باشد؟

(Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) ۱۰ (۲) ۱۹ (۳) ۲۰ (۴) ۵

۴۹- کدامیک از روشهای ذیل جزء روشهای کیفی است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) هلت-وینترز (۲) باکس و جنکینز (۳) دلفی (۴) میانگین متحرک وزنی

۵۰- کدامیک از مدل های زیر جزء مدل های ARIMA نیست؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) دلفی (۲) میانگین متحرک ساده (۳) رگرسیون ساده (۴) میانگین متحرک وزنی

۵۱- مقدار C در مدل هلت - وینترز دارای چه مقدار می تواند باشد؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) کوچکتر از ۱ (۲) کوچکتر از ۱ و بزرگتر از صفر  
(۳) بزرگتر از صفر (۴) بین -۱ و +۱

۵۲- کدامیک از شاخص های ذیل فاقد واحد است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) MSE (۲) MAPE (۳) RMSE (۴) MAD

۵۳- فرض کنید در مدل هلت - وینترز  $A = 0.3$  و  $B = 0.4$  و  $\bar{X}_n = 49/47$  و  $\bar{X}_{n-1} = 49/47$  و  $T_{n-1} = -0.31$

مقدار  $T_n$  چقدر است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱)  $-0.49$  (۲)  $-0.251$  (۳)  $-0.304$  (۴)  $-0.33$

۵۴- کدامیک از مدل های ذیل از صحت بالا برخوردارند؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) تلفیق باکس جنکینز با هلت-وینترز (۲) تلفیق باکس جنکینز با میانگین متحرک  
(۳) تلفیق هلت-وینترز با نموهموار ساده (۴) به معیارهای صحت بستگی دارد

۵۵- داده های ذیل بیانگر تعداد تقاضای کامپیوترهای شخصی طی یک دوره ۵ ماهه است

| مرداد | تیر | خرداد | اردیبهشت | فروردین | ماه   |
|-------|-----|-------|----------|---------|-------|
| ۹۱    | ۸۰  | ۵۸    | ۱۰۲      | ۸۰      | تقاضا |

با استفاده از روش میانگین متحرک ، تقاضای ماه شهریور را پیش بینی کنید؟ ([Wwww.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

(۱) ۷۶/۳ (۲) ۸۰ (۳) ۸۳/۷ (۴) ۸۲/۲