

در باطن گردانی، عدم درج مشخصات و ابتدا در حین حالت خواب اول، با شماره عدد معین شده در جدول آزمون است.  
 اینصورت  
 صحتی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سوالات نوع  
 و کد کنکور درج شده در روی دفترچه سوالات و پایین پاسخنامه را بنویسید.  
 ابتدا

مکمل نوع سوالات - کودکان

- ۱-۶ در هنگام پذیرش نوزاد نرم حاصل رانسان سوزش با ۱۵-۳۰۰ گرم، آبشار داخله اول A و طبقه پنجم ۲  
 در بخش نورانی، اولین اقدام پرستار کدام است؟  
 ۱) تنفس گرمای حار می  
 ۲) تعقیب منقبض با شیر مادر  
 ۳) پس از رانسان طبیعی، در برنامه مراقبت از مادر، کدام اقدام صحیح است؟  
 ۱) بعد از اولین اجابت مزاج می تواند غذای جامد و مایعات مصرف کند  
 ۲) برای تسکین پس از غذای پس از رانسان از کیسهول مقدماتی استفاده می شود  
 ۳) به محض اینکه مادر قادر به راه رفتن باشد، می تواند از ستر خارج شده و حرکت کند  
 ۴) در صورت نیاز به نوس، باس هیت لاس و تسکینوی برنده در روز ۲ بار انجام شود  
 ۱-۸ در معاینه و ارزیابی بدو تولد نوزاد با سن هنگام تولد ۲۷ هفته، کدام مورد غیرطبیعی محسوب می شود؟  
 ۱) فشارخون ۷۰/۳۶ mmHg و ۱ = 36.3C  
 ۲) رنکش سوز و شست و فونتانل قدامی ۲ سانتی متر  
 ۳) HR = 140/min و RR = 14/min  
 ۴) نور سر ۳۴ میلی متر و قد ۵۱ سانتی متر  
 ۱-۹ در بخش نورانی، کدام مورد زیر، نیاز به پیگیری تخصصی دارد؟  
 ۱) عدم دفع مدفوع پس از گذشت ۴۸ ساعت از تولد  
 ۲) مشاهده ترشحات صورتی روی پوششک نوزاد دختر  
 ۳) عدم دفع ادرار در ۱۲ ساعت اول پس از تولد  
 ۴) وجود موهایی لاتوگ در ناحیه کتف  
 ۱۱- درخصوص نوزادان بستری در بخش، کدام مورد صحیح است؟  
 ۱) سیلروس پس از ۱۶ mg/dl در نوزاد نرم ۲ روز به نیاز به بستری در NICU دارد  
 ۲) زردی فیزیولوژیک از روز ۲ تا ۱۰ روز طول می کشد و تا روز ۷-۱۰ ناپدید می شود  
 ۳) در نوزاد ۳۴ هفته، زردی تا سطح بیلی روبین ۱۵ mg/dl، فیزیولوژیک است  
 ۴) زردی نوزاد در بدو تولد پس از تولد ناشی از ستر مادر است  
 ۱۱۱- کدام گروه دارویی از داروهای زیر، برای کاهش فشار خون در مادران باردار با پره کلانسی در نواحی اورژانس  
 ضروری است؟  
 ۱) نیتروگلیسرین - لازیکس - سولفامید مزیدیم  
 ۲) هیدرالازین - سولفات منیزیم - دیازپام  
 ۳) هپارین - هیدرالازین - آنالژت  
 ۴) کلیدی ترین نکته که پرستاران باید در ارتباط با کودکان، به آن توجه داشته باشند، چیست؟  
 ۱) وضعیت روانی عاطفی کودک و خانواده  
 ۲) اولویت های خانواده و بیماری کودک  
 ۳) نیتروگلیسرین - لازیکس - سولفامید مزیدیم  
 ۴) هیدرالازین - سولفات منیزیم - دیازپام  
 ۱۱۲- نوع بیماری و تأثیر آن چیست؟  
 ۱) کس و مرحله آن  
 ۲) کس و مرحله آن  
 ۳) کس و مرحله آن  
 ۴) کس و مرحله آن

NOTE 8

IN CAMERA

- ۱۱۳- بهترین استوار برای غیر دارای برای برای کاهش درد و اسپرانت کودکان در پروستاتهای مردان چیست؟  
 ۱) حشمت روانی کودک  
 ۲) انحراف فکری  
 ۳) منظور از انحراف غیر دارای در آسید کودکان کدام است؟  
 ۴) سولون برای  
 ۵) سولون برای  
 ۶) کنترول برای  
 ۱۱۵- برون ده انرژی کمتر از چند  $ml/kg/h$  نشان دهنده نارسایی کلیه در کودکان است؟  
 ۱) 4  
 ۲) 3  
 ۳) 2  
 ۴) 1  
 ۱۱۶- منظور از اختلالات استدار چیست؟  
 ۱) اختلالات عضلانی که بر خورد با خون و مایعات بدن  
 ۲) اختلالات عضلانی که اختلال عملکرد کوک درک انرژی  
 ۳) اختلالات در بخش های مختلف و غیر مستقیم  
 ۴) اختلالات عملکرد طبیعی در سیستم عضلانی

از روی ستار آلفا

- ۱۱۷- مددجو به جای گفته «بازی» از چه روی به استفاده می کند این حالت چه نام دارد؟  
 ۱) سولون برای  
 ۲) سولون برای  
 ۳) سولون برای

- ۱۱۸- پروستار دارای تو گسی پروستارین و هالوپریدول را به صورت عضلانی به مددجو تزریق نمود و مددجو دچار بیقراری عمیقی شده است. تشخیص این حالت چیست؟  
 ۱) قبل از تزریق باید برای جلوگیری پروستارین با پروپانولول گوارش شود  
 ۲) قبل از تزریق باید به تزریق وریدی انسداد می کرد  
 ۳) پروستارین جایی پروستارین پس از تزریق باید وریدی شود  
 ۴) پروستارین جایی هالوپریدول پس از تزریق باید وریدی شود  
 ۱۱۹- مددجو معتقد است که اطلاعات موجود در نقش همراه او به سرعت رفته است او در کدام مورد دچار مشکل شده است؟  
 ۱) سولون برای  
 ۲) سولون برای

- ۱۲۰- در کدام مورد زیر مددجو جهت مدیریت استوار خود از تکنیک دفاعی استفاده کرده است؟  
 ۱) پوشش موقع صحبت کردن با من: خیلی تند حرف می زند  
 ۲) پروستار فکر می کند که من با هدایت او مشکل دارم  
 ۳) پروستار: زدن دارم تا من خیلی دقت دارم  
 ۴) ای کاش پوشش مرا زودتر بر زمین کند

- ۱۲۱- مددجوی مبتلا به اختلال اضطرابی پروستار که با اینگونه اظهارات در ارتباط است کدام مورد درباره او صحیح است؟  
 ۱) روان نرزد یا نباید روان گردان  
 ۲) روان نرزد یا نباید روان گردان  
 ۳) روان نرزد یا نباید روان گردان  
 ۴) روان نرزد یا نباید روان گردان

- ۱۲۲- از داروهای زیر کدام مورد موارد جانی کمتری دارد؟  
 ۱) هالوپریدول (Haloperidol)  
 ۲) کلوزاپین (Clonazepam)  
 ۳) کلوزاپین (Clonazepam)  
 ۴) کلوزاپین (Clonazepam)

- ۱۲۳- کاربرد آمپول در الکترو شوک چیست؟  
 ۱) کنترول تحریکات مغزی  
 ۲) جلوگیری از القایات عضلانی

۱۲۴- مددجو دارای اختلال اسکیزوفرنی است. دامن وی نیز سابقه ابتلا به این اختلال را دارد. کدام مورد زیر، در بروز اختلال روانی برای وی مطرح است؟

- (۱) ایمونولوژیکی
  - (۲) اندوکرینی
  - (۳) اجتماعی
  - (۴) ژنتیکی
- ۱۲۵- از تکنیکهای ارتباطی زیر، کدام مورد می تواند خاصیت خودرمانی داشته باشد؟

- (۱) سکوت
- (۲) بازتاب
- (۳) گشایش منحنی
- (۴) رویارویی

۱۲۶- هدفان مناسب، در کدام حالت زیر دیده می شود؟

- (۱) زمان هواخوری احساس کرده مورچه ها روی دستم راه می روند.
- (۲) برای ساختن واگسن کرونا خیلی زحمت کشیدم.
- (۳) در داخل بخش، همه درباره من حرف می زنند.
- (۴) شبیه آدم فضایی ها لباسی های مرا بردند.

۱۲۷- مددجو اظهار می دارد که جهت درمان به بیمارستان مراجعه کرده، اما پدرش نیز در بروز بیماری وی سهیم است. در وضعیت روانی وی، کدام مورد غیرطبیعی ارزیابی می شود؟

- (۱) بستی
- (۲) قضاوت
- (۳) حافظه
- (۴) درک

### بهداشت جامعه

۱۲۸- از خصوصیات همه گیری تک متغیعی مداوم در بیماری های واگیردار، کدام مورد صحیح است؟

- (۱) تعداد موارد، سریعاً افزایش و کاهش می یابد.
- (۲) از چندین محل و منبع، به طور همزمان شروع می شود.
- (۳) طول مدت، همه گیری، به اندازه یک دوره کمون بیماری است.
- (۴) شروع تدریجی دارد و موارد، به طور غیرهمزمان بروز می کنند.

۱۲۹- آزمونیه که در صورت تکرار در فرد و شرایط یکسان، نتایج یکنواخت و ثابتی داشته باشد، نشان دهنده کدام یک از مشخصات غربالگری است؟

- (۱) ویژگی
- (۲) قابلیت اطمینان
- (۳) بازده
- (۴) حساسیت

۱۳۰- جست و جوی بیماری در مرحله قبل از بروز بیماری، مطابق با کدام سطوح پیشگیری است؟

- (۱) بدوی
- (۲) سطح اول
- (۳) سطح دوم
- (۴) سطح سوم

۱۳۱- واگسن های بدو تولد، طبق برنامه واگسناسیون ایران، کدام اند؟

(۱) ب-ت-ز - هیپاتیت ب - MMR

(۲) پنج گانه - فلج اطفال خوراکی - هیپاتیت ب

(۳) ب-ت-ز - هیپاتیت ب - فلج اطفال خوراکی

(۴) پنج گانه - فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی

۱۳۲- ماهیت کدام یک از واگسن ها، آنتی ژن سطحی و بروس است؟

- (۱) فلج اطفال
- (۲) دیفتیری کزاز
- (۳) ب-ت-ز
- (۴) هیپاتیت ب

۱۳۳- این سازی کودک ۹ ماهه که در موعد مقرر مراجعه نکرده، در اولین مراجعه، شامل کدام واگسن هاست؟

(۱) ب-ت-ز - پنج گانه - فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی

(۲) ب-ت-ز - سه گانه - فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی

(۳) سه گانه - فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی

(۴) پنج گانه - فلج اطفال خوراکی - MMR

۱۳۴- اینکه چرا بعضی افراد از خدمات بهداشتی استفاده می کنند و گروه دیگر این کار را نمی کنند، با کدام الگه، زیر، قابل توجیه است؟

- (۱) تغییر رفتار
- (۲) باور سلامتی
- (۳) برنامه ریزی
- (۴) بین فردی

- ۱۳۵- در کدام قسمت از گاز با خانواده پرستار بهداشت خانواده علاقه یورگالاسیوس در این باره می شود؟  
 ۱) پرستار بزرگ  
 ۲) متخصص پرستاری  
 ۳) سوپر مایر جسی کوک که کدام مورد است؟  
 ۴) سوپر مایر واکسین از نظر روانی  
 ۱۳۶- کدام یک از گازهای موجود در هوا از مهم ترین آلوده کننده های هوا به شمار می آید؟  
 ۱) دی اکسید گوگرد  
 ۲) دی اکسید نیتروژن  
 ۳) اکسیژن  
 ۴) اکسیژن  
 ۱۳۷- پیشگیری سطح ۳ بر کدام دسته از فعالیتها تأکید دارد؟  
 ۱) جنس گیری از پیشرفت بیماری  
 ۲) تشخیص بیماری  
 ۳) تشخیص و مراقبت  
 ۴) مراقبت

### بخش های ویژه

- ۱۳۸- برای بیمار با گاز خون شریانی  $PaCO_2 = 24$  و  $HCO_3^- = 26$  و  $pH = 7.48$  تفسیر مناسب کدام است؟  
 ۱) آلکالوز متابولیک  
 ۲) آلکالوز تنفسی  
 ۳) آلکالوز متابولیک با جبران کامل  
 ۴) اسیدوز تنفسی با جبران کامل  
 ۱۳۹- در درمان اختلالات اسید و باز، به طور کلی بهترین اقدام کدام است؟  
 ۱) کنترل مجدد ABG  
 ۲) شناسایی و درمان علت زمینه ای  
 ۳) حفظ حداکثر اکسیژناسیون  
 ۴) در مقیاس گمای گلاسکو، به بیماری که با تحریک در دهانک چشمهای او باز می کند، در تکمیل از اصوات تأیید استفاده می کند و در قسمت حرکات با تحریک در دهانک، حرکت دارد را نشان می دهد، چه نمره ای داده می شود؟  
 ۱) ۹  
 ۲) ۱۱  
 ۳) ۱۲  
 ۴) ۱۳  
 ۱۴۰- در اتمام ساکتین بیمار، کدام مورد صحیح تر است؟  
 ۱) کمتر ساکتین برای تحلیله بهتر ترشحیات، تا بیشتر حد ممکن وارد تریخته شود  
 ۲) در صورت غلبه یوش ترشحیات از آب فقط استفاده می کند  
 ۳) ساکتین باز، باعث کاهش نفوذهای تنفسی می شود  
 ۴) مدیریت مان ساکتین، حداکثر ۱۰ تا ۱۵ تریخته باشد  
 ۱۴۱- پرستار در هنگام انفوزیون الکترولیت، باید در کدام مورد، احتیاط بیشتری بعمل آورد؟  
 ۱) کلسیم  
 ۲) سدیم  
 ۳) پتاسیم  
 ۴) منیزیم  
 ۱۴۲- تا چند ساعت قبل از اعمال جراحی، می توان به بیمارمان مایعات داد؟  
 ۱) ۸  
 ۲) ۶  
 ۳) ۴  
 ۴) ۲  
 ۱۴۳- در صورت خروج ناخواسته لوله تراشه توسط بیمار، کدام اقدام صحیح است؟  
 ۱) حمایت با اکسیژن، پوشش مناسب و مانیورینگ کامل  
 ۲) آرام سازی بیمار با دارو و لوله گذاری مجدد  
 ۳) کنترل گازهای خون شریانی  
 ۴) لوله گذاری مجدد





- ۱۵۷- در کدام شیوه مراقبت پرستاری، قدرت تصمیم‌گیری پرستار افزایش می‌یابد، ولی بازتاب مهارت کافی در بیمار وجود ندارد؟  
 ۱) گروهی  
 ۲) مشارکتی  
 ۳) خودمراقبتی  
 ۴) پرستاری
- ۱۵۸- پایه و اساس تکنیک‌های کار قلبی در اکثر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی، کدام شیوه است؟  
 ۱) گروهی  
 ۲) مشارکتی  
 ۳) خودمراقبتی  
 ۴) پرستاری
- ۱۵۹- در کدام شیوه پرستاری، سوپر ویزور و سوپرستار در بیمارستان، از نظر مهارت‌های پرستاری، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؟  
 ۱) مشارکتی  
 ۲) خودمراقبتی  
 ۳) گروهی  
 ۴) پرستاری
- ۱۶۰- مشاهده نارسایی در حلقه عملکرد کدام شیوه است؟  
 ۱) گروهی  
 ۲) مشارکتی  
 ۳) خودمراقبتی  
 ۴) پرستاری

### تخصصی مراقبت

- ۱۶۱- کدام‌یک از تشخیص‌های پرستاری زیر، صحیح است؟  
 ۱) اختلال در تصویر ذهنی به علت از دست دادن استقلال  
 ۲) اختلال در حرکت فیزیکی در ارتباط با محدودیت حرکت مفاصل  
 ۳) تغییر در تعادله به علت عدم توانایی ایستادن  
 ۴) نسیج‌های در ارتباط با سرطان
- ۱۶۲- اگر بیمار بعد از جراحی در حلقه عملکرد کدام وسیله زیر، برای این کار مناسب است؟  
 ۱) ماسک تنفسی  
 ۲) کانال بینی (Nasal cannula)  
 ۳) ماسک بینی (Venturi mask)  
 ۴) ماسک با تنفس محدود بازدمی (Partial rebreather mask)
- ۱۶۳- هدف از تشویق بیمار به مضمون مایعات بعد از جراحی شکم کدام است؟  
 ۱) تشویق خروج ترشحات معده  
 ۲) حفظ تعادل مایعات بدن  
 ۳) تسهیل حرکت فیزیکی  
 ۴) رفع تهوع و استفراغ
- ۱۶۴- کدام مایع کانویه پوستی است که به علت تولید بیش از حد گلازین ایجاد می‌شود و موجب خارش پوستی می‌گردد؟  
 ۱) آکرونی (Acrolysis)  
 ۲) کلوئید (Keloid)  
 ۳) قشقه (Scars)  
 ۴) قشقه (Scars)
- ۱۶۵- تشخیص تریبون شکل مایع پوستی در سوراخ‌های کدام مورد است؟  
 ۱) گدازه‌های گره که سطح آن با پوست‌های پرمای پوشیده شده  
 ۲) تاول‌های پاره‌شده و زخم‌های تشکیل شده بر روی آنها  
 ۳) زخم‌های از زخم‌های پاره‌شده تاول‌های پاره‌شده و زخم‌های تشکیل شده بر روی آنها  
 ۴) مایعات پوستی به تعداد کم در سوراخ‌های پاره‌شده
- ۱۶۶- بعد از عمل هیستروکتومی، نشستن طولانی مدت بیمار - ابتلا به بروز چه عارضی را بیش از همه می‌آورد؟  
 ۱) خستگی  
 ۲) سردی  
 ۳) تورم  
 ۴) خونریزی
- ۱۶۷- در مراقبت پس از کونیزاسیون، کدام مورد صحیح است؟  
 ۱) عدم استفاده از کاندوم به هنگام مقاربت  
 ۲) خارج کردن پگ وازلین  
 ۳) انجام یوگین، بلافاصله پس از آن  
 ۴) استراحت تا ۲۴ ساعت

- ۱۵۸- در جراحی واریکوسل، مهم‌ترین مراقبت کدام است؟  
 ۱) کنترل I&O بیمار  
 ۲) بررسی جوهر بزرگ سستمانیک  
 ۳) نشاندن وضعیت نشسته به بیمار به مدت ۴ ساعت  
 ۴) استفاده از گسپه‌بند و سفت‌بند در ساعت اول
- ۱۵۹- در هیپوکالسمی، مهم‌ترین تدبیر پرستاری کدام است؟  
 ۱) رژیم پرشار از پتاسیم  
 ۲) محدودیت مصرف پتاسیم  
 ۳) مصرف پتاسیم  
 ۴) استفاده از مدرها
- ۱۶۰- توصیه به نفس آرام در یک سیستم بسته ایماند پاکت گاغدی، از تدابیر پرستاری کدام احتلال اسید باز است؟  
 ۱) اسفنجور تنفسی  
 ۲) الکلور تنفسی  
 ۳) الکلور متابولیک  
 ۴) اسفنجور متابولیک