

- ۱۰۶- عمل انجام یعنی مادری جفت کدام قسم است؟  
 ۱) آنکه ای  
 ۲) فاقدی  
 ۳) دلخواهی  
 ۴) حدازی
- ۱۰۷- پسندیده بوزرس مادمهای بروی ناتائق، سرعت‌ترین کدام‌یک از عروق، پرتوی پستانگویان کنده است؟  
 ۱) شریان ناق  
 ۲) شریان معزی میانی  
 ۳) شریان رحمی  
 ۴) شریان درودی
- ۱۰۸- اقدام مناسب برای شردهن مادری که رایان طبیعی داشته و بطور تاکه انسان مستلاحه نباشد درجه همراه با اختناق پستان شنیده کدام عورت است?  
 ۱) قطع شردهن و باشد محله بستان و برویان آتش‌بیوک  
 ۲) قطع شردهن و با تحریمه بستان و بوزرس از نظر سایر علل نباشد  
 ۳) آنکه شردهن و با تخلیه بستان و بوزرس از نظر سایر علل نباشد  
 ۴) آنکه شردهن و با تخلیه بستان و بوزرس از نظر سایر علل نباشد
- ۱۰۹- مدار هوایی که بعد از یک بازدم طبعی در ریشه‌ها باقی می‌ماند به کدام عورت زیر اطلاق می‌شود؟  
 ۱) حجم از خبره بازیعی  
 ۲) غرفت حیانی  
 ۳) غرفت زمی
- ۱۱۰- مدار بیار به استولن در زمان بارداری دیانتی در کدام‌یک از ماه‌های بارداری افزایش می‌باید؟  
 ۱) ماهه اول  
 ۲) ماهه دوم  
 ۳) ماهه آخر
- ۱۱۱- حامل باردار ۲۲ هفته با علامت بروغ و استخراج و ابت ۲۸°C، کود دارد بهلولی جب و سورش و نکود ابراز مراجعته می‌کند محتمل نوبن تشخیص کدام است؟  
 ۱) کوریوسیت  
 ۲) بیوتوفرمت خوار  
 ۳) سریکالانس
- ۱۱۲- حامل بارداری با علامت بیش قلبی، لگنی نفس و خستگی مواجهه می‌کند و اظهار می‌داده که در هنگام استراحت، قدر را در باجه قلب احساس می‌کند. مربوط در کدام عوامله از سوابی قلبی قدر دارد؟  
 IV ۱) III ۲) II ۳)
- ۱۱۳- حامل ۳۵ ساله‌ای که هفته پست رایانه کوده با ابت ۲۸°C و نسب ۱۱۰ بار در تلفیه مواجهه می‌کند در مقامه رحیم‌حسان و دارای ترشحات بیش از انت کدام در میان میان متابس است؟  
 ۱) هسترسوسی  
 ۲) ریانه سریانی  
 ۳) سری و دیمان طی
- ۱۱۴- اکتوبر

۱۱۴- حانمی ۳۰ هفته با گروه خونی A منفی و شوهر AB مثبت و تست گومیس غیرمستقیم منفی مراجعه می‌کند. اقدام مناسب، کدام است؟

(۱) تزریق یک عدد آمبول روگام در ۷۲ ساعت اول بعد از زایمان

(۲) چک گومیس غیرمستقیم در ۳۲ هفتگی و کور دوسیز

(۳) آمبوستر

(۴) تزریق یک عدد آمبول روگام در ۳۲ هفتگی و ۷۲ ساعت اول بعد از زایمان

۱۱۵- کتراندیکاپسون نسبی القا با تحریک زایمان، کدام یک از موارد است؟

(۱) حفت سرراهی

(۲) CPD

(۳) اسکار رحمی ماترسیون کلاسیک

(۴)- کدام بیماری، با بزرگ شدن حفت همراه است؟

(۱) نرموبوتیوپی

(۲) اربروپلاستور جنینی

(۳) پلی سنتمی

### بارداری و زایمان ۳ و ۴

۱۱۷- در سندروم انسفال خون جنینی دوقلویی، خون تخلیه شده از طریق کدام یک از عروق، به ذکری انتقال می‌باید؟

(۱) ساهرگ به ساهرگ

(۲) ساهرگ به ساهرگ

(۳) ساهرگ به ساهرگ

۱۱۸- حانمی ۳۹ هفته با  $P = 150/100$  و برونتستوری  $1^+$  مراجعه می‌کند. اقدام مناسب، کدام است؟

(۱) ختم حاملگی

(۲) استراحت نسبی با کنترل P/B نازم

(۳) دادن سولفات مئزیم و سزارین

۱۱۹- حانمی ۳۰ هفته را بیهوش به اورژانس می‌آورد.  $P = 120/\text{min}$ ,  $B/P = 70\text{mmHg}$  و دارای انقباضات

نانظم است. تشخیص احتمالی چیست؟

(۱) حفت سرراهی

(۲) دکولمان

(۳) اکلامی

(۴) آمبولی مایع آنتیوتک

۱۲۰- حانمی G2, 37 هفته، با حونه بزی نسبتاً شدید و روشن مراجعه می‌کند. صربان قلب جنین ۱۴۴ بار در

دقیقه و انقباضی ندارد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

(۱) حفت سرراهی

(۲) دکولمان

(۳) واژوپروا

(۴) واژوپروا

۱۲۱- زنی ۳۰ ساله، با علایم تب، کاهش اشتها، سردرد و شکم درد مراجعه کرده و اظهار می‌دارد هفته پیش

مقدار کمی آبریزی داشته، ولی به طور سریابی از بیمارستان مرخص شده و در حال حاضر، حرکت جنین وی کم

شده،  $t = 27.8^\circ\text{C}$ ,  $\text{PR} = 109/\text{min}$ ,  $B/P = 110/68$  و

سیز خاکستری رنگ در وازن با بوی بد استشمام می‌شود. اقدام درمانی مناسب، کدام است؟

(۱) درمان انتظاری، نجوبز آنتی بیوتیک

(۲) نمونه برداری از ترشحات وازن

(۳) ستری در بیمارستان

(۴) درمان سریابی، دادن نسبت و خوردن مایعات فراوان

۱۲۲- معیار تشخیصی در حاملگی دوقلویی، برای پیش‌بینی زایمان پره‌ترم، کدام مورد است؟

(۱) سیستم امتیازبندی خطوط

(۲) سنجش فیبرونکتین جنینی

(۳) امتیازبندی Nagnet برای واژنوز باکتریابی

(۴) سنجش استریول برآق

۱۲۳- زنی ۳۸ ساله، G4 هنگام زایمان واژنال دچار افت فشارخون و تنفس منقطع می‌شده، سیانوز در لب وی

نیز همراه با انعقاد درون عروقی منتشر مشاهده می‌شود. تشخیص احتمالی چیست؟

(۱) آمبولی مایع آنتیوتک

(۲) ادم رید

(۳) نارسایی گردش خون

از همه تخصصی عنوای شعلی تعاون (کد شغلی ۱۲۴۶۷)

- ✓ ۱۲۴- در دکولمان حفت، کدام یک از انواع الگوهای صریان قلب، شایع نر است؟  
 Acceleration (۱) Beat to beat variation (۲) Late deceleration (۳) Variable deceleration (۴)  
 ۱۲۵- خانمی ۶۲ ساله، با بارگیری کشید آب بین از ۴۶ ساعت مراجعت می کند. در معاینه واژنال، دیلاتاسیون ۱cm و افاسیان ۵۰٪ است. اقدام مناسب، کدام است؟  
 (۱) سرارت (۲) رایمان طبیعی (۳) اینداکشن (۴) درمان انتظاری و استراحت تا زمان برم  
 ۱۲۶- رایمان واژنال، معمولاً در کدام یک از انواع بروج انعام می شود؟  
 (۱) کامل (۲) فولتیک دولل (۳) فولتیک منفرد (۴) فرانک  
 ۱۲۷- در لگن های مردانه، تنگی ورودی چه مشخصه ای دارد?  
 (۱) بخصوصی و ارتفاع زیاد دارد. (۲) گرد و ارتفاع کم دارد.  
 (۳) متنفسی و ارتفاع متوسط دارد. (۴) گرد و ارتفاع زیاد دارد.

### سماری های زنان و ناباروری

- ۱۲۸- شایع ترین میومی که بیشتر از بقیه، کاهش باروری ایجاد می کند، کدام است؟  
 (۱) زبرسروزی (۲) داخل حداری (۳) زبرمخطاطی (۴) زبرسروزی و داخل حداری  
 ۱۲۹- زنی ۴۵ ساله با توده ای نویر در بستان طرف چپ مراجعت می کند و در ماموگرافی ضایعه بدحیم مشاهده می شود. اقدام بعدی چیست؟  
 (۱) بیوسی ضایعه (۲) ماستکتومی رادیکال (۳) ماستکتومی رادیکال اصلاح شده (۴) ماستکتومی توtal  
 ۱۳۰- اقدام مناسب برای خانم ۱۲ هفتهه مبتلا به سرطان سرویکس، کدام است؟  
 (۱) کورتاژ، بعد از معالجه (۲) شروع معالجه، بدون نوجه به حاملگی  
 (۳) درمان انتظاری تا ۳۶ هفتگی و بعد از سرارت (۴) درمان انتظاری تا بعد از رایمان  
 ۱۳۱- خانمی ۴۰ ساله G4P3، یک ماهونیم بیش، با تشخیص سقط ناقص کورتاژ شده و از هنگام کورتاژ ناگفون، خوبنیزی دارد. دقیق ترین روش تشخیص، کدام است؟  
 (۱) کورتاژ مجدد و ارسال به باتولوزی (۲) سونوگرافی جهت بررسی محبوبات رحم  
 (۳) آنتی بیوتیک تراپی و تجویز ترکیبات ارگومترین برای قطع خوبنیزی (۴) اندازه گیری میزان BHCG سرم  
 ۱۳۲- کدام یک از سندرمهای در دختر ۱۸ ساله ای که دارای آمنوره اولیه و زنوتیپ ۱۶ و فنوتیپ زنانه است، شایع تر است؟  
 (۱) کالمن (۲) بیضه زن نما (۳) ترفر  
 ۱۳۳- عدم ریزش کلیه لایه های آندومتر، در هنگام بربود، بیشتر به دلیل کدام عامل رخ می دهد؟  
 (۱) افزایش فعالیت مهار کننده های پروتازی (۲) افزایش رهایی اسید فسفاتاز از سلول هاس اولیز شده  
 (۳) پوشش موسنی کربوهیدرات بر روی سلول های لایه بازال (۴) افزایش فعالیت آندوتلین ۱  
 ۱۳۴- در کدام یک از انواع هیپر بلازی رحمی، میزان پیشرفت به سمت بدحیمی سرطانی، بیشتر است؟  
 (۱) ادنوماتوئیدی با آنسی (۲) کیستیک بدون آنسی (۳) کیستیک با آنسی (۴) ادنوماتوئیدی بدون آنسی

۱۳۵- مهم‌ترین نسبت تشخیصی در هیبوتیروتیدی اولیه، کدام مورد است؟

- (۱) افزایش TSH سرم
- (۲) کاهش تیروکسین آزاد
- (۳) کاهش اندکس تیروکسین سرم
- (۴) کاهش TRU

۱۳۶- در معاینه خانمی که دارای یک نodule ۵ cm فیکس در سینه است، بهترین اقدام کدام است؟

- (۱) اقدام خاصی ضرورت ندارد
- (۲) تکرار خودآزمایی بستان
- (۳) کنترل هر ۳ ماه توسط پزشک
- (۴) بیوسی توode

۱۳۷- خانمی ۵۰ ساله که از ۵ سال پیش یاتسه شده، با لکه‌بینی عراجعه می‌گردید. در معاینه، یک پولیپ بایه‌دار به قطر ۲×۲ در سرویکس دیده می‌شود. اقدام پیشنهادی کدام است؟

- (۱) کوئیزاسیون
- (۲) برداشت پولیپ و بررسی یاتولوزی
- (۳) هیسترکتومی
- (۴) بولیکتومی و کورتاژ فراکشنال

۱۳۸- شایع‌ترین عارضه PID، کدام مورد است؟

- (۱) عود بیماری
- (۲) نازابی
- (۳) حاملگی خارج رحمی

#### بهداشت مادر و کودک:

۱۳۹- برای محاسبه میزان مرگ‌ومیر شیرخواران (IMR)، تعداد مرگ کودکان در تعداد موالید زنده، در کدام محدوده زمانی در نظر گرفته می‌شود؟

- (۱) وسط سال
- (۲) همان سال
- (۳) دو ماه بعد
- (۴) هنگام تولد

۱۴۰- شایع‌ترین علت مرتبط با باکتریسم گرم منفی، بعد از عمل مادران بستربال در بیمارستان، کدام باکتری‌های زیر است؟

- (۱) مرتبط با آبیشه‌های خارج شکمی
- (۲) مرتبط با سوند ادراری
- (۳) مرتبط با آسده‌های داخل شکمی
- (۴) مربوط به عقوبات تنفسی

۱۴۱- مسافرت هوایی تا کدام هفته بارداری، بی خطر است؟

- (۱) ۳۴
- (۲) ۳۶
- (۳) ۳۰
- (۴) ۳۲

۱۴۲- محاسبه کدام نوع از شاخص‌های جمعیت‌شناختی، میزان باروری را بهتر برآورد می‌گردید؟

- (۱) میزان باروری کلی (TFR)
- (۲) میزان باروری عمومی (GFR)
- (۳) میزان باروری عمومی نکاحی (GMFR)
- (۴) میزان خام موالید (CBR)

۱۴۳- در روند مراقبت از دهان و دندان زنان باردار، در کدام ماه‌های زیر، وضعیت آنان در پرونده خانوار ثبت می‌شود؟

- (۱) سوم، چهارم و پنجم
- (۲) دوم، چهارم و ششم
- (۳) سوم، پنجم و هفتم
- (۴) چهارم، پنجم و ششم

۱۴۴- کدام یک از انواع کنتراسپتیوهای خوراکی، بر مقدار شر مادر تأثیری ندارد؟

- (۱) صرف استرورزنسی
- (۲) بستگی به نوع ندارد
- (۳) استرورزنسی و پروزستی

۱۴۵- شایع‌ترین علت افت هموگلوبین در دوران بارداری، کدام است؟

- (۱) کاهش جذب آهن از دستگاه گوارش
- (۲) مصرف حینی جفتی آهن
- (۳) خوریزی دوران بارداری

۱۴۶- افزایش حجم پلاسمای بدون افزایش هموگلوبین مادری

۱۴۶- به‌غیر از موارد تکنولوژی مناسب، عدالت اجتماعی و مشارکت جامعه، کدام مورد زیر، از اجزای اصول اساسی PHC است؟

- (۱) هماهنگی بین بخشی
- (۲) توسعه منابع
- (۳) سیاست بین‌المللی

۱۴۷- تجویز کدام بک از واکسن‌ها در دوران بارداری، منسوب است؟  
 ۱) هیات B  
 ۲) دیفسری

۳) پولیومیلیت (IPV)  
 ۴) اوریون

۱۴۸- اختلال ایجاد CVA در کدام گروه از زنان مصرف‌کننده فرودهای ضد بارداری، کمتر است؟  
 ۱) سردرد میگرنی  
 ۲) فشارخون بالا

۳) زنان غیرسینگاری زیر ۳۵ سال  
 ۴) سینگاری

۱۴۹- مکانیسم اثر کدام بک از موارد در ارتباط با فرودهای ضد حاملگی صادق است؟  
 ۱) پروزسترون‌ها موجب تغییر ترشحات دهانه رحم می‌شوند.

۲) استروزون‌ها موجب تغییر ترشحات دهانه رحم می‌شوند.  
 ۳) قرص‌ها باعث هیبریزوفی عدد آندومتر می‌شوند.

۴) ا نوع سکونشیال با افزایش اثر بر LH موجب کاهش ترشح آن می‌شوند.

#### نوزادان:

۱۵۰- در نوزادان متولدشده از مادر معتاد به هروئین، میزان بروز کدام عارضه، کاهش بیندا می‌کند؟  
 ۱) ناهنجاری‌های مادرزادی  
 ۲) سیدرم دیسترس تنفسی  
 ۳) مردهزابی

۴) سیدرم مرگ ناگهانی نوزاد

۱۵۱- علت کیست‌های واقعی بندناه، کدام است؟  
 ۱) پروزسترون زیاد مادر  
 ۲) بقایای آلانتوس

۳) دزترسانس موضعی زله وارتون  
 ۴) عفونت داخل آمنیونی

۱۵۲- تفاوت علایم و نشانه‌های کرن ایکتروس در کدام بک از روزهای بعد از تولد در نوزادان ترم در مقایسه با نوزادان نارس، به ترتیب، مشاهده می‌شود؟

۱) ۵-۲ بعد از تولد و روز ۴  
 ۲) ۳-۱ بعد از تولد و روز ۵

۳) ۵-۲ و هفتم بعد از تولد  
 ۴) ۳-۱ و هفتم بعد از تولد

۱۵۳- حداکثر میزان بیلی‌رویین سرم در نوزادان مبتلا به زردی فیزیولوژیک، معمولاً چند میلی‌گرم در دسی‌لیتر است؟  
 ۱) ۱۰  
 ۲) ۱۵  
 ۳) ۲۰  
 ۴) ۱۶

۱۵۴- برای نوزادی که در روز بعد از تولدش، زردی با درصد بالایی از بیلی‌رویین نوع مستقیم دارد، محتمل ترین تشخیص کدام است؟

۱) زردی ناشی از شیر مادر

۲) زردی فیزیولوژیک تشدیدشده

۳) ترانسفورمون داخل رحمی به علت اریتروبلاستوز جنبی

۴) کلستاز داخل کبدی

۱۵۵- تجویز واکسن BCG را در چه هنگام و چندبار توصیه می‌کنید؟

۱) دو ماهگی - یکبار  
 ۲) ۴ و ۶ ماهگی - دوبار

۳) ۴، ۲ و ۶ ماهگی - سه‌بار

۱۵۶- شر مناسب برای نوزاد VLBW (دارای وزن بسیار کم هنگام تولد) کدام است؟

۱) شیر خشک فاقد لاکتونز

۲) شیر مادر

۳) شیر خشک انسانی مخصوص نوزاد پره‌ترم

۴) شیر گاو

۱۵۷- شاخص‌های افزایش ۵۰ درصدی قد، ۵۰ سانتی‌متری دور سر و سه برابر شدن وزن هنگام تولد نشان‌دهنده چندسالگی کودک است؟

۱) سه  
 ۲) دو

۳) یک  
 ۴) چهار

## ارزیت تکمیلی فتوان خودکار

- ۱۵۸

النام مناسب برای خودکار که در ماده ۲۰۰ بحث آنرا در اینجا آورده است

وکر میباشد

(DIBIG)


B = دلخواه

B = دلخواه

۱۳۹

صفحه ۴

۲۰۰. ۰۰



- ۱۶۱- سنه شدن زوده هنگام موجود (درز) جمجمه، چه نایتند می شود؟  
 ۱) متکوستالوس  
 ۲) انسان بیننا  
 ۳) گرلوبوسیدرس  
 ۴) کرابوپتری
- ۱۶۲- در ۲۰-۲۵ هنگام دوره جمنی، چه انفاقی می افتد؟  
 ۱) آفریکش درن است به قدر جمین رخ می دهد  
 ۲) سلول فرقی سری شبستانهاست سیرول می شود  
 ۳) رشد سلولی جمین می باشد هفتاد و ۲۱-۲۱ بارداری بینش است  
 ۴) لاتوک اتحاد می شود
- ۱۶۳- عامل ارتناطی سان روده و کیسه زردگ، گدام بک از موارد است?  
 ۱) بین رونه  
 ۲) مجرای زردگی  
 ۳) امینون و عیان روده  
 ۴) تکواک
- ۱۶۴- الائمالی در اثر سنه شدن گدام ناحیه از لوله عصب اتحاد می شود؟  
 ۱) سری  
 ۲) سری - ذئب  
 ۳) سری - دنی
- ۱۶۵- تقسیم سلولی، در گدام بک از لایه های سلول های تروقوبلاست انعام می شود?  
 ۱) هر دو لایه سیو و سن  
 ۲) امپریولاست  
 ۳) سیتوتروقوبلاست
- ۱۶۶- عدد بستان، مو و ناخن، از گدام بک از لایه های جمی عصب منق می شوند؟  
 ۱) آندورم  
 ۲) مژوردم  
 ۳) مژوردم و آندورم
- ۱۶۷- بوزهای آنوبه و نالنه و غنای دهانی - حلق، در گدام هنله بارداری اتحاد می شود?  
 ۱) جهارم  
 ۲) ششم  
 ۳) سوم
- ۱۶۸- در هرایند کاسترولاسون، تشكیل گدام بک از موارد زیر، انعام می شود?  
 ۱) سه لایه آندورم، آندورم و مژوردم  
 ۲) اندامها  
 ۳) بوتوکوره
- ۱۶۹- سلول های منق از گدام قسمت، منا تشكیل مژوردم خارج روپانی است?  
 ۱) کیسه زردگ  
 ۲) سیتوتروقوبلاست  
 ۳) اندورم
- ۱۷۰- سلول های این بلاست، منا تشكیل گدام بک از لایه های جمی است?  
 ۱) آندورم  
 ۲) مژوردم و آندورم  
 ۳) آندورم، آندورم و آندورم